

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### **Xolair® Solution injectable en seringue préremplie (nouvelle seringue préremplie, 27G)**

#### **Qu'est-ce que Xolair et quand doit-il être utilisé?**

Xolair, dont le principe actif est l'omalizumab, est disponible sous forme de solution prête à l'emploi en seringue préremplie.

##### *Asthme allergique*

Xolair est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants (à partir de 6 ans) atteints d'asthme allergique sévère et persistant, dont les symptômes d'asthme ne sont pas suffisamment contrôlés par l'utilisation de sprays contre l'asthme contenant des corticostéroïdes à forte dose et d'autres médicaments et qui présentent des symptômes fréquents pendant la journée et la nuit.

##### *Polypes nasaux*

Xolair est utilisé chez les adultes (à partir de 18 ans) pour traiter les polypes nasaux qui ne sont pas suffisamment contrôlés par l'utilisation de sprays nasaux contenant des corticostéroïdes.

##### *Urticaire chronique spontanée (UCS)*

Xolair est utilisé chez les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans et plus) souffrant d'urticaire chronique spontanée, dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés par les médicaments habituels pour cette maladie, tels que les antihistaminiques, et dont aucune autre maladie n'est responsable de l'urticaire.

Selon prescription du médecin.

#### **Quand Xolair ne doit-il pas être utilisé?**

*Xolair ne doit pas être utilisé/administré,*

- si vous êtes allergique à Xolair ou à l'un des composants de Xolair mentionnés à la fin de cette notice.
- Si vous pensez que vous pourriez être allergique, demandez conseil à votre médecin.

#### **Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Xolair?**

Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser Xolair:

- si vous avez des problèmes de reins ou de foie.
- si vous avez déjà eu une réaction allergique grave (anaphylaxie), provoquée par exemple par un médicament, une piqûre d'insecte ou un aliment.

Soyez attentif aux signes de réactions allergiques. Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des signes de réaction allergique grave (voir «Quels effets secondaires Xolair peut-il



provoquer?)). Il est important que votre médecin vous apprenne à reconnaître les premiers symptômes d'une réaction allergique grave et à gérer ces réactions si elles se produisent (voir «Comment utiliser Xolair?»). La plupart des réactions allergiques graves se produisent au cours des 3 premières utilisations de Xolair. C'est pourquoi les 3 premières applications doivent être administrées sous la surveillance du médecin.

Veuillez informer votre médecin si vous souffrez de douleurs ou d'inflammations articulaires, de gonflement des ganglions lymphatiques, d'éruptions cutanées et d'autres réactions cutanées ou de fièvre. Il pourrait s'agir de signes de ce que l'on appelle une maladie sérique.

- Si vous souffrez d'une maladie dans laquelle votre propre système immunitaire attaque des parties de votre corps (maladie auto-immune).
- Si vous vivez dans une région où les infections par des parasites sont fréquentes ou si vous voyagez dans une région de ce type, votre résistance à de telles infections peut être affaiblie par Xolair.

Xolair n'est pas indiqué pour la prévention ou le traitement d'autres maladies allergiques telles que:

- Allergie alimentaire, rash cutané allergique, rhume des foins.
- Symptômes d'asthme aigu, comme une crise d'asthme soudaine.

### *Enfants et adolescents*

#### *Asthme allergique*

Xolair ne doit pas être administré aux enfants de moins de 6 ans. Son utilisation n'a pas été étudiée chez les enfants de moins de 6 ans. La seringue préremplie Xolair de 300 mg n'est pas destinée à être utilisée chez les patients de moins de 12 ans. La seringue préremplie Xolair de 75 mg et la seringue préremplie Xolair de 150 mg peuvent être utilisées chez les enfants âgés de 6 à 11 ans présentant un asthme allergique.

#### *Urticaire chronique spontanée*

Xolair ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans. Son utilisation n'a pas été étudiée chez les enfants de moins de 12 ans.

#### *Polypes nasaux*

Xolair ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans. Son utilisation n'a pas été étudiée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Xolair peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils ou des machines!

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

### **Xolair peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?**

#### *Grossesse*

Prévenez votre médecin avant de commencer le traitement avec Xolair si vous êtes enceinte ou si vous avez l'intention de le devenir. Votre médecin décidera si vous pouvez utiliser le médicament pendant la grossesse.



Si vous tombez enceinte pendant le traitement par Xolair, informez-en immédiatement votre médecin.

### *Allaitement*

Si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce médicament. Xolair peut passer dans le lait maternel.

### **Comment utiliser Xolair?**

Xolair est injecté sous la peau (on parle alors d'injection sous-cutanée).

### *Comment administrer Xolair*

Les 3 premières injections vous ont été administrées par votre médecin ou par un professionnel de la santé sous sa surveillance.

Avant de vous auto-injecter, vous devez être formé(e) à la manière d'injecter le médicament.

Votre injection de Xolair peut également vous être administrée par un soignant après que celui-ci a été correctement formé.

Pour des instructions détaillées sur l'injection de Xolair, veuillez consulter le «Mode d'emploi de la seringue préremplie Xolair» à la fin de cette notice.

### *Formation à l'identification des réactions allergiques graves.*

Votre médecin doit également vous expliquer:

- comment reconnaître les premiers signes et symptômes des réactions allergiques graves.
- que faire si ces symptômes apparaissent. Pour plus d'informations sur les premiers signes et symptômes des réactions allergiques graves, voir «Quels effets secondaires Xolair peut-il provoquer?».

### *Quelle est la quantité de Xolair administrée ?*

#### *Asthme allergique et polypes nasaux*

En fonction de votre poids corporel et des résultats d'une analyse de sang effectuée avant le début du traitement, votre médecin déterminera la dose et les intervalles de dosage.

En règle générale, 1 à 4 injections sont nécessaires toutes les 2 ou 4 semaines.

Il se peut que vous ne remarquiez pas immédiatement une amélioration de votre asthme après le début du traitement par Xolair. Il faut généralement plusieurs semaines pour que les effets se fassent pleinement sentir.

#### *Urticaire chronique spontanée*

Vous aurez besoin d'une à deux injections toutes les quatre semaines.

N'arrêtez pas de prendre vos médicaments sans en parler à votre médecin.

### *Utilisation chez les enfants et les adolescents*

#### *Asthme allergique*

Xolair ne doit pas être administré aux enfants de moins de 6 ans. Son utilisation n'a pas été étudiée chez les enfants de moins de 6 ans. La seringue préremplie Xolair de 300 mg n'est pas destinée à être utilisée chez les patients de moins de 12 ans. La seringue préremplie Xolair de 75 mg et la seringue préremplie Xolair de 150 mg peuvent être utilisées chez les enfants âgés de 6 à 11 ans présentant un asthme



allergique.

#### *Urticaire chronique spontanée*

Xolair ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans. Son utilisation n'a pas été étudiée chez les enfants de moins de 12 ans.

#### *Polypes nasaux*

Xolair ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans. Son utilisation n'a pas été étudiée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

#### *Si vous avez utilisé plus de Xolair que vous n'auriez dû*

Si vous avez utilisé accidentellement une quantité de Xolair supérieure à celle prescrite, demandez conseil à votre médecin.

#### *Si vous avez oublié d'utiliser Xolair*

Si vous avez oublié une administration de Xolair, injectez la dose dès que vous vous en souvenez. Contactez ensuite votre médecin pour savoir quand vous devez injecter la dose suivante.

#### *Si vous arrêtez d'utiliser Xolair*

Poursuivez le traitement par Xolair aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit.

L'interruption ou l'arrêt du traitement par Xolair peut entraîner la réapparition des symptômes de votre maladie.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

#### **Quels effets secondaires Xolair peut-il provoquer?**

Certains effets secondaires peuvent être graves.

Consultez immédiatement un médecin si vous remarquez des signes des effets secondaires graves suivants:

#### *Rares: effets secondaires - (ces effets secondaires peuvent concerner jusqu'à 1 utilisateur sur 1000):*

Réactions allergiques sévères soudaines: si vous remarquez des signes soudains d'allergie, tels qu'une éruption cutanée, des démangeaisons ou des papules sur la peau, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue, du larynx, de la trachée ou d'autres parties du corps, un rythme cardiaque rapide, des étourdissements et des vertiges, un essoufflement, une respiration sifflante ou des difficultés à respirer, informez-en immédiatement votre médecin.

#### *Fréquence inconnue: (fréquence non évaluable à partir des données disponibles):*

Saignements ou bleus (*signes d'un faible nombre de plaquettes sanguines (thrombopénie)*),

- Apparition conjointe de certains des symptômes suivants: douleurs, engourdissement ou picotements dans les bras et les jambes, nodules ou taches en relief sur la peau, faiblesse et fatigue, perte d'appétit et perte de poids (signes de ce que l'on appelle le «syndrome de Churg-Strauss»).
- Maladie sérique: les signes sont l'apparition conjointe de certains des symptômes suivants: douleurs articulaires, raideur, éruption cutanée, fièvre, ganglions lymphatiques gonflés/grossis.



Celle-ci survient généralement entre un et cinq jours après l'injection.

#### *Autres effets secondaires possibles*

D'autres effets secondaires sont présentés ci-dessous.

#### *Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)*

- Fièvre (surtout chez les enfants)

#### *Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)*

- Réactions au site d'injection telles que douleur, gonflement, démangeaisons et rougeur
- Douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen (chez les enfants)
- Maux de tête (très fréquents chez les enfants)
- Mal de gorge et nez bouché (rhinopharyngite)
- Sensation de pression ou douleur au niveau des joues et du front (sinusite et céphalée sinusale)
- Infections des voies respiratoires supérieures, telles que les inflammations de la gorge et le rhume
- Douleurs ou sensations de brûlure lors de la miction et besoin fréquent d'uriner (symptômes possibles d'une infection des voies urinaires)
- Douleurs aux membres supérieurs ou inférieurs (bras et/ou jambes)
- Douleurs musculaires et/ou osseuses et/ou articulaires (douleur musculosquelettique, myalgie, arthralgie)
- Sensation vertigineuse

#### *Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)*

- Envie de dormir ou fatigue
- Fourmillements ou engourdissement des mains ou des pieds
- Évanouissement, chute de tension en position assise ou debout, sensation de chaleur
- Inflammation du pharynx, maux de gorge, toux, problèmes respiratoires aigus
- Nausées, diarrhée, indigestion
- Démangeaisons, papules, éruptions cutanées, sensibilité accrue de la peau au soleil
- Prise de poids
- Symptômes grippaux
- Gonflement des bras

#### *Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)*

- Infections par des parasites

#### *Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)*

- Gonflement des articulations
- Perte des cheveux ou de poils
- Accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

### **À quoi faut-il encore faire attention?**

#### *Stabilité*



Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

#### *Remarques concernant le stockage*

Conserver au réfrigérateur (2 à 8 °C). Ne pas congeler. Conserver la seringue préremplie dans son carton pour la protéger de la lumière et de l'humidité. La seringue préremplie ne doit pas être conservée plus de 48 heures à température ambiante (25 °C).

Conserver hors de la portée des enfants.

Demandez à votre pharmacien comment éliminer le médicament lorsque vous ne l'utilisez plus.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

#### **Que contient Xolair?**

Xolair 75 mg, 150 mg et 300 mg Solution injectable en seringue préremplie

#### *Principes actifs*

##### *Xolair 75 mg:*

Une seringue préremplie contient 75 mg d'omalizumab dans 0,5 ml de solution.

##### *Xolair 150 mg:*

Une seringue préremplie contient 150 mg d'omalizumab dans 1 ml de solution.

##### *Xolair 300 mg:*

Une seringue préremplie contient 300 mg d'omalizumab dans 2 ml de solution.

#### *Excipients*

Chlorhydrate d'arginine, chlorhydrate d'histidine monohydraté, histidine, polysorbate 20, eau pour préparations injectables.

#### **Numéro d'autorisation**

68030 (Swissmedic)

#### **Où obtenez-vous Xolair? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

1 seringue préremplie (aiguille de 27 gauge) Xolair de 75 mg

1 seringue préremplie (aiguille de 27 gauge) Xolair de 150 mg

1 seringue préremplie (aiguille de 27 gauge) Xolair de 300 mg

#### **Titulaire de l'autorisation**

Novartis Pharma Schweiz AG, Risch

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

#### **MODE D'EMPLOI DE LA SERINGUE PRÉREMPLE XOLAIR**


Lisez l'ENTIÈRETÉ de ce mode d'emploi avant de procéder à l'injection. Il est important de ne pas essayer d'effectuer l'injection vous-même avant que vous y ayez été formé(e) par votre médecin, votre pharmacien



ou le soignant. La boîte contient une seringue préremplie unique scellée dans une coque en plastique.

## Description de la seringue préremplie

### Seringue préremplie Xolair



Après l'injection du médicament, le protège-aiguille est activé et couvre l'aiguille.

### Informations importantes sur la sécurité




1. N'ouvrez la boîte en carton scellée que lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser la seringue préremplie.
2. N'utilisez pas la seringue préremplie si la fermeture de la boîte en carton ou de la coque plastique n'est pas intacte, car l'utilisation de la seringue peut alors ne plus être sûre.
3. N'utilisez pas la seringue préremplie si elle est tombée sur une surface dure ou si elle est tombée après retrait du capuchon de l'aiguille.
4. Ne laissez pas la seringue préremplie sans surveillance en des lieux où d'autres personnes peuvent y avoir accès.
5. Veillez à ne pas toucher les ailettes du protège-aiguille avant l'utilisation. Si vous les touchez, il est possible que le protège-aiguille soit activé trop tôt.
6. Ne retirez le capuchon de l'aiguille que lorsque vous êtes prêt(e) à vous administrer l'injection.
7. La seringue préremplie ne doit pas être réutilisée. Jetez la seringue préremplie usagée immédiatement après utilisation dans un récipient pour seringues.

### Préparation de la seringue préremplie Xolair

Remarque: en fonction de la dose prescrite par votre médecin, vous devrez peut-être préparer une ou plusieurs seringues préremplies et injecter le contenu de chacune d'entre elles.




**Le tableau suivant donne des exemples du nombre d'injections de chaque volume de dose dont vous avez besoin pour une dose donnée:**




| Seringue préremplie<br>Xolair de 75 mg, avec<br>piston bleu                                      |                                          | Seringue préremplie<br>Xolair de 150 mg, avec<br>piston violet                                     |                                                                                       | Seringue préremplie<br>Xolair de 300 mg, avec<br>piston gris                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Piston bleu<br> |                                          | Piston violet<br> |                                                                                       | Piston gris<br> |  |
| Posologie                                                                                        | Seringues<br>nécessaires pour la<br>dose | Bleue<br>75 mg                                                                                     | Violette<br>150 mg                                                                    | Grise<br>300 mg                                                                                   |  |
| 75 mg                                                                                            | 1 bleue                                  |                   |                                                                                       |                                                                                                   |  |
| 150 mg                                                                                           | 1 violette                               |                                                                                                    |    |                                                                                                   |  |
| 225 mg                                                                                           | 1 bleue + 1 violette                     |                   |    |                                                                                                   |  |
| 300 mg (12 ans et plus)                                                                          | 1 grise                                  |                                                                                                    |                                                                                       |                |  |
| 300 mg (enfants de moins de 12 ans)                                                              | 2 violettes                              |                                                                                                    |   |                                                                                                   |  |
| 375 mg (12 ans et plus)                                                                          | 1 bleue + 1 grise                        |                 |                                                                                       |              |  |
| 375 mg (enfants de moins de 12 ans)                                                              | 1 bleue + 2 violettes                    |                 |  |                                                                                                   |  |
| 450 mg (12 ans et plus)                                                                          | 1 violette + 1 grise                     |                                                                                                    |  |              |  |
| 450 mg (enfants de moins de 12 ans)                                                              | 3 violettes                              |                                                                                                    |  |                                                                                                   |  |
| 600 mg (12 ans et plus)                                                                          | 2 grises                                 |                                                                                                    |                                                                                       |              |  |
| 600 mg (enfants de moins de 12 ans)                                                              | 4 violettes                              |                                                                                                    |  |                                                                                                   |  |

### Préparation de la seringue préremplie






|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Étape 1. Amener à température ambiante</b></p> <p>Sortez la boîte contenant la seringue préremplie du réfrigérateur <b>et laissez-la reposer non ouverte pour qu'elle atteigne la température ambiante (au moins 30 minutes)</b>.</p> <p>Remarque: si vous avez besoin de plusieurs seringues préremplies (une seringue préremplie dans chaque boîte) pour obtenir votre dose complète (voir le tableau de dosage), sortez toutes les boîtes du réfrigérateur en même temps.</p> |
|   | <p><b>Étape 2. Rassembler les accessoires</b></p> <p>Vous avez besoin des éléments suivants (non fournis dans la boîte):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tampon imbibé d'alcool</li> <li>• Coton ou tampon de gaze</li> <li>• Boîte d'élimination pour les objets coupants et pointus (récipient pour seringue)</li> <li>• Pansement adhésif</li> </ul>                                                                                                                   |
|  | <p><b>Étape 3. Déballage</b></p> <p>Ouvrez la coque en plastique en retirant le couvercle. Retirez la seringue préremplie en la tenant au centre comme indiqué.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |




|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="129 91 592 853"> <div data-bbox="129 91 193 147">4</div>  </div>          | <p><b>Étape 4. Vérifier la seringue préremplie</b></p> <p>Regardez à travers la fenêtre de la seringue préremplie. Le liquide doit être limpide ou légèrement trouble. La couleur peut varier d'incolore à jaune brun pâle. Vous pouvez voir des bulles d'air dans le liquide, ce qui est normal. N'essayez <b>pas</b> d'évacuer l'air.</p> <p>Vérifiez la dose (75 mg, 150 mg ou 300 mg) du médicament et la date de péremption sur l'étiquette.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N'utilisez <b>pas</b> la seringue préremplie si le liquide contient des particules ou si le liquide est nettement trouble ou brun.</li> <li>• N'utilisez <b>pas</b> la seringue préremplie si elle semble endommagée ou si elle présente une fuite.</li> <li>• N'utilisez <b>pas</b> la seringue préremplie après la date de péremption (EXP) mentionnée sur l'étiquette et l'emballage extérieur de la seringue préremplie.</li> </ul> <p>Dans tous les cas, consultez votre médecin ou votre pharmacien.</p> |
| <div data-bbox="129 898 592 1368"> <div data-bbox="129 898 193 954">5a</div>  </div>     | <p><b>Étape 5. Choisir le site d'injection</b></p> <p>L'injection doit être faite dans le haut de la cuisse ou dans la partie inférieure du ventre, mais pas dans la zone de 5 cm autour du nombril.</p> <p>N'injectez <b>pas</b> dans des zones sensibles, meurtries, rouges, squameuses ou indurées, ou dans des zones présentant des cicatrices ou des vergetures. Remarque: si vous avez besoin de plusieurs seringues préremplies pour administrer votre dose complète, assurez-vous que les injections soient à une distance d'au moins 2 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div data-bbox="129 1413 480 1727"> <div data-bbox="129 1413 193 1469">5b</div>  </div> | <p>Si un soignant, un aidant ou un médecin vous administre l'injection, il/elle peut également la réaliser dans l'extérieur du bras.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Injection de Xolair</b></p>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Étape 6. Nettoyer le site d'injection</b></p> <p>Lavez-vous les mains.</p> <p>Nettoyez le site d'injection choisi avec un tampon imbibé d'alcool. Laissez le site sécher avant l'injection.</p> <p>Ne touchez <b>pas</b> et ne soufflez <b>pas</b> sur la peau nettoyée avant l'injection.</p>                                                             |
|    | <p><b>Étape 7. Enlever le capuchon de l'aiguille</b></p> <p>Retirez le capuchon de l'aiguille de la seringue préremplie verticalement en le tenant fermement. Il se peut qu'une goutte de liquide soit visible à la pointe de l'aiguille. Ceci est normal.</p> <p>Ne remettez <b>pas</b> le capuchon sur l'aiguille.</p> <p>Jetez le capuchon de l'aiguille.</p> |
|   | <p><b>Étape 8. Introduire l'aiguille</b></p> <p>Pincez doucement la peau au niveau du site d'injection et maintenez la pression tout au long de l'injection. De l'autre main, insérez l'aiguille dans la peau selon un angle d'environ 45 degrés (voir illustration).</p> <p>Ne poussez <b>pas</b> sur le piston lorsque vous insérez l'aiguille.</p>            |
|  | <p><b>Étape 9. Commencer l'injection</b></p> <p>Poussez lentement le piston <b>jusqu'à la butée</b>. Ceci permettra d'injecter une dose complète.</p>                                                                                                                                                                                                            |




10



### Étape 10. Injection complète

Vérifiez que la tête de piston se trouve entre les ailettes du dispositif de protection comme indiqué sur l'illustration. Ceci garantit que le dispositif de sécurité a été activé et qu'il recouvre l'aiguille après l'injection.

11



### Étape 11. Relâcher le piston

Maintenez la seringue préremplie dans le site d'injection et relâchez lentement le piston jusqu'à ce que l'aiguille soit recouverte par le dispositif de sécurité. Retirez la seringue préremplie du site d'injection et relâchez la pression. Une petite quantité de sang peut s'écouler du site d'injection. Vous pouvez appuyer sur le site d'injection avec un coton ou un tampon de gaze jusqu'à l'arrêt du saignement. Ne frottez **pas** le site d'injection. Couvrez, si nécessaire, le site d'injection avec un petit pansement.

Remarque: si vous avez besoin de plusieurs seringues préremplies pour administrer votre dose complète, jetez la seringue préremplie usagée comme décrit à l'étape 12. Répétez les étapes 2 à 12 pour toutes les seringues préremplies dont vous avez besoin pour administrer votre dose complète.

Effectuez les injections immédiatement les unes après les autres.

Veillez à ce que les injections soient espacées d'au moins 2 cm.

**Après l'injection**



12

**Étape 12. Jeter la seringue préremplie**

Jetez la seringue préremplie usagée immédiatement après utilisation dans un conteneur d'élimination des objets tranchants (c'est-à-dire un conteneur pour objets tranchants, refermable ou similaire).

Ne jetez **pas** la seringue préremplie avec les ordures ménagères.

N'essayez **pas** de remettre le capuchon de l'aiguille sur la seringue.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien concernant l'élimination correcte du récipient pour objets tranchants. Il peut y avoir des réglementations locales pour l'élimination.

