

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

WALA Pulmonium suc contre la toux, sirop

Médicament anthroposophique

Quand WALA Pulmonium suc contre la toux est-il utilisé?

Selon la conception anthroposophique de l'homme et de la nature, WALA Pulmonium suc contre la toux peut être utilisé en cas d'affections des voies respiratoires et pour faciliter l'expectoration en cas de toux et de toux bronchique.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de la conception anthroposophique de l'homme et de la nature.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si la toux persiste durant plus de 7 jours.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si WALA Pulmonium suc contre la toux peut être pris simultanément.

Remarque: 15 ml de sirop contiennent 7.1 g de saccharose (sucre). 5 ml de sirop contiennent 2.4 g de saccharose (sucre). Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré. Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre WALA Pulmonium suc contre la toux.

Quand WALA Pulmonium suc contre la toux ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Wala Pulmonium suc contre la toux ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 24 mois que sur prescription médicale.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

WALA Pulmonium suc contre la toux peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser WALA Pulmonium suc contre la toux?



Sauf prescription contraire du médecin, prendre WALA Pulmonium suc contre la toux à l'aide du gobelet doseur inclus, selon les instructions ci-dessous:

Enfants en bas âge (28 jours à 23 mois): prendre 5 ml de sirop 3 à 4 fois par jour dans un peu d'eau chaude.

Enfants à partir de 2 ans, adolescents et adultes: prendre 15 ml de sirop 3 fois par jour; en cas de troubles aigus, prendre 5 ml de sirop toutes les 2 heures dans un peu d'eau chaude.

Bien agiter le flacon avant l'emploi!

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant en bas âge / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires WALA Pulmonium suc contre la toux peut-il provoquer?

En cas de prise du WALA Pulmonium suc contre la toux, les effets indésirables suivants peuvent survenir: des réactions allergiques telles qu'éruptions cutanées, urticaire, gonflement de la peau/des muqueuses (œdème) et démangeaisons ont été rarement observés. Des rougeurs cutanées, une formation de cloques, des gerçures aux lèvres, une irritation oculaire et de la fièvre ont aussi été rapportées dans de très rares cas.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Conservable 4 semaines au réfrigérateur (2 – 8 °C) après ouverture.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30°C et conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient WALA Pulmonium suc contre la toux?

5 ml de sirop contiennent:

Principes actifs

59 mg de Petasites hybridus e radice rec. ferm 33c D3 (HAB 33c), 882 mg de Piceae summitatis rec. extractum aquosum fluidum (Picea abies (L.) H. Karst, summitates); RDE 1:4, agent d'extraction: saccharose/eau (1:1), 2059 mg de Plantaginis folii rec. extractum aquosum fluidum (Plantago lanceolata L., folium rec.); RDE 1:4, agent d'extraction: saccharose/eau (1:1)

Excipients

Eau purifiée, 2352 mg de sucre



Numéro d'autorisation

39460 (Swissmedic)

Où obtenez-vous WALA Pulmonium suc contre la toux? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

WALA Pulmonium suc contre la toux est disponible en flacons de 90 ml.

Titulaire de l'autorisation

WALA Schweiz AG, 3011 Berne

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

