

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a personnellement été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Carbolevure®, Capsules

Pierre Fabre Pharma AG

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que Carbolevure et quand doit-il être utilisé?

Les substances actives de Carbolevure sont la levure vivante et le charbon actif.

Carbolevure Capsules pour adultes convient aux adultes, aux adolescents et aux enfants à partir de 6 ans:

Carbolevure Capsules pour enfants convient aux nourrissons, aux jeunes enfants et aux enfants de 28 jours à 5 ans:

- En cas de diarrhée aiguë avec ou sans ballonnements,
- Pour la normalisation de la flore intestinale,

Si des troubles digestifs surviennent pendant ou après un traitement antibiotique.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas de ballonnements (gaz intestinaux) et/ou de lourdeurs d'estomac, évitez les légumineuses comme les lentilles, les haricots, les pois, certains légumes verts comme le chou, le chou-fleur et le brocoli, de même que le pain de son et le pain complet.

Il est indispensable en cas de diarrhée aiguë:

- Que vous buviez abondamment des boissons salées ou sucrées afin de compenser la perte de liquide provoquée par la diarrhée,
- Que vous vous nourrissiez de la manière suivante pendant la durée de la diarrhée:
 - Certains aliments sont à exclure, notamment les crudités, les fruits avec la peau et les plats épicés,
 - Les viandes maigres, les pommes de terre et le riz doivent être privilégiés.

Il convient de veiller à un apport en liquide adapté, en particulier chez les patients âgés et les enfants.

Quand Carbolevure ne doit-il pas être pris?

Carbolevure ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à ses substances actives ou à l'un de ses excipients. Les nouveau-nés de moins de 28 jours ne doivent pas être traités avec Carbolevure.

Une diarrhée nécessitera une consultation de votre médecin:

- Chez les enfants de moins de 3 ans,
- Si les troubles persistent ou si aucune amélioration n'est constatée au bout de 3 jours de traitement,
- En cas de fièvre supérieure à 38 °C,
- Si la présence de sang ou de mucus dans les selles est constatée,
- Si des douleurs abdominales inhabituellement fortes se produisent,
- En cas de soif intense ou de sensation de langue sèche.



Ce sont les premiers signes d'une perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin décidera alors s'il est nécessaire de compenser cette perte de liquide.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Carbolevure?

En général, l'action d'autres médicaments pris par voie orale simultanément peut être modifiée par Carbolevure. Ceci est surtout à prendre en considération pour les préparations à base de fer. Par mesure de précaution, veuillez à prendre Carbolevure au moins à 2 heures de distance de tout autre médicament.

En particulier chez les personnes âgées et les enfants, il faut veiller en plus à administrer une quantité suffisante de liquides.

Veuillez en outre informer votre médecin, pharmacien ou droguiste, si:

- vous souffrez d'une autre maladie;
- vous êtes allergique;
- vous prenez d'autres médicaments en usage interne (même en automédication!).

Carbolevure peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines

Carbolevure n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Comment utiliser Carbolevure?

Carbolevure, capsules pour les adultes

Adultes: La dose conseillée est d'une capsule 3 fois par jour.

Enfants et adolescents de 6 à 18 ans: La dose conseillée est d'une capsule 2 fois par jour.

Carbolevure, capsules pour les enfants

Enfants âgés de 2 à 5 ans: La dose conseillée est d'une capsule 3 fois par jour.

Nourrissons et jeunes enfants de 28 jours à 23 mois: La dose conseillée est d'une capsule 1 fois par jour.

En cas de diarrhée aiguë, la dose peut être doublée pour tous les groupes d'âge.

Mode d'administration

Ce médicament peut diminuer l'absorption d'autres médicaments, par mesure de précaution, veuillez à prendre Carbolevure au moins à 2 heures de distance de tout autre médicament.

Carbolevure, capsules pour les adultes:

Prendre les capsules sans les croquer avec un verre d'eau.

Carbolevure, capsules pour les enfants:

Chez les nourrissons, les jeunes enfants et les enfants âgés de 28 jours à 5 ans: ouvrir la capsule, mélanger le contenu avec un peu de liquide ou de nourriture sur une cuillère et l'administrer.

La capsule peut être ouverte en tournant légèrement ses deux moitiés en sens inverse l'une de l'autre et en les écartant simultanément et précautionneusement. Le contenu de la capsule ouverte ne doit pas être administré avec un liquide ou des aliments trop chauds.

L'utilisation et l'innocuité de Carbolevure pour les nouveau-nés de moins de 28 jours n'ont pas encore été étudiées. Raison pour laquelle le médicament n'est pas prescrit pour ce groupe d'âge.



Durée du traitement:

La durée du traitement est de 3 jours maximum pour tous les groupes d'âge.

Si vous avez pris une quantité de Carbolevure plus importante que celle qui convient:

- Demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.
- La prise d'une dose trop importante de Carbolevure peut entraîner une constipation. Le traitement sera symptomatique.

Si vous avez oublié de prendre Carbolevure:

- Ne doublez pas la dose lors de la prise suivante pour compenser.

Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, n'hésitez pas à les poser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Carbolevure peut-il provoquer?

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Arrêtez le traitement et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des symptômes de l'effet indésirable suivant, car vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical d'urgence:

- Réaction allergique généralisée soudaine, grave et potentiellement mortelle en l'absence de soins médicaux immédiats (réaction anaphylactique), au cours de laquelle vous pouvez présenter une éruption de la peau (telles qu'urticaire, démangeaisons), un gonflement, des difficultés à respirer, une accélération du rythme cardiaque, des étourdissements, de la transpiration, une chute de la tension artérielle et/ou une perte de conscience/évanouissement .

Autres effets secondaires possibles:

- Noircissement des selles
- Éruption cutanée ou démangeaisons ou éruption cutanée avec démangeaisons
- Bronchospasmes
- Constipation

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Vous ne devez pas dépasser la date de péremption du médicament indiquée sur le récipient à côté de la mention «EXP».

Conservation

Conservez le médicament hors de portée des enfants, à température ambiante (15-25 °C).

Autres recommandations

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Carbolevure?



Carbolevure, capsules pour les adultes: capsules noires/écarlate de taille 1 contenant une poudre noire.

Carbolevure, capsules pour les enfants: capsules noires/écarlate de taille 4 contenant une poudre noire.

Principes actifs

Une gélule pour adultes contient comme principes actifs 108,5 mg de levure vivante et 109 mg de charbon actif. Une gélule pour enfants contient comme principes actifs 47,7 mg de levure vivante et 48 mg de charbon actif.

Excipients

Les gélules pour enfants et adultes contiennent les excipients suivants: polyvidone K 30, acide silicique (silice colloïdale anhydre) et gélatine, colorants rouge et noir d'oxyde de fer (E 172), dioxyde de titane (E 171), et rouge érythrosine (E 127).

Numéro d'autorisation

37456 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Carbolevure? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Carbolevure peut être obtenu dans les pharmacies et les drogueries, sans ordonnance médicale.

Il est proposé: pour les adultes, dans des boîtes de 20 et 30 capsules dans blister.

Il est proposé: pour les enfants, dans des boîtes de 20 capsules dans blister.

Titulaire de l'autorisation

Pierre Fabre Pharma SA, Bâle

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

