

Alfuzosina axapharm

Sprache: italienisch

History

Version (intern) xxxxxp-xx (yy)	Datum	Beschreibung, Bemerkung (durch Autor/in erstellt)	Stand der Info	Visum	Datum / Visum
01	2009	Ersterstellung		xx	
02	16.07.2012	Update gemäss Acino (Alfuzosin Cimex) St.09.2011, genehmigt per 12.7.2012		KS	
03	13.08.2012	Zusammenstellen der Sprachen		KS	
04	28.02.2013	Umformatieren	07.2010	EF	
30100p-03 (01)	02.05.2016	Update des Basispräparates, Korrekturmodus	10.2014	KS	
30100p-03 (02)	06.05.2016	Bereinigt	10.2014	KS	
30100p-04 (01)	17.12.2018	Textupdate gemäss Fuzocim	08.2017	CL	
30100p-04 (02)	10.01.2019	Bereinigtes Manuskript	08.2017	CL	
30100p-05 (01)	02.03.2020	Textupdate gemäss Fuzocim	01.2020	KE	
30100p-05 (02)	09.04.2020	Bereinigtes Manuskript	01.2020	KE	
30100p-06 (01)	31.08.2020	Textupdate gemäss Fuzocim	05.2020	KE	
30100p-06 (02)	01.10.2020	Bereinigtes Manuskript	05.2020	MJ	
30100p-07 (01)	05.12.2022	Neue Version aufgrund Redesign (keine Textänderung)	05.2020	OH	
30100p-08 (01)	09.07.2025	HMV4-Anpassung nach VBG	05.2020	CL	09.07.2025/WE
30100p-08 (02)	18.08.2025	Bereinigtes Manuskript	05.2020	CL	
30100p-09 (01)	21.08.2025	Textupdate gemäss Xatral Uno	07.2024	CL	26.08.2025/WE
30100p-09 (02)	08.09.2025	Bereinigtes Manuskript	07.2024	CL	

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.



Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Alfuzosina axapharm

Che cos'è Alfuzosina axapharm e quando si usa?

Nell'iperplasia (ingrossamento) benigna della prostata, i disturbi di funzionamento sono legati non soltanto all'aumento del volume della ghiandola, ma anche ad una componente nervosa che, stimolata, provoca un aumento dello stato di tensione della muscolatura liscia delle vie urinarie inferiori, determinando di conseguenza una minzione difficoltosa.

L'alfuzosina cloridrato, bloccando la trasmissione di questo stimolo nervoso nella regione della prostata, determina un allentamento dello stato di tensione, facilitando in tal modo l'evacuazione delle urine.

Nel trattamento sintomatico dell'iperplasia della prostata, Alfuzosina axapharm può essere assunto soltanto su prescrizione medica.

Quando non si può assumere Alfuzosina axapharm?

Soltanto il medico può stabilire i casi in cui il medicamento può essere prescritto. Non assuma questo medicamento:

- in caso di allergia al principio attivo o ad uno dei suoi componenti,
- se soffre di malattie del fegato,
- se assume contemporaneamente un potente inibitore del CYP3A4 (medicamenti come ad es. gli antimicotici come itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, l'antibiotico claritromicina, ritonavir o cobicistat per il trattamento contro l'HIV),
- se assume un altro alfabloccante (medicamenti come ad es. terazosina e tamsulosina per il trattamento dell'ingrossamento della prostata).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Alfuzosina axapharm?

Effetti collaterali a livello cardiovascolare

Alcuni soggetti possono manifestare una particolare sensibilità all'Alfuzosina axapharm che si traduce in un abbassamento della pressione arteriosa stando in posizione eretta. Nelle persone in età avanzata possono manifestarsi con maggiore frequenza effetti collaterali legati a un abbassamento della pressione arteriosa. Tale sintomatologia, che può manifestarsi nelle ore successive all'assunzione del medicamento, è preceduta da stordimento, sudorazione, stanchezza e potrebbe provocare anche un malessere con perdita di coscienza. In questo caso, è opportuno sdraiarsi con le gambe sollevate, fino alla completa scomparsa dei sintomi che sono comunque transitori.

I pazienti con disturbi circolatori cerebrali preesistenti, sintomatici o asintomatici, rischiano di incorrere in disturbi ischemici cerebrali, a causa della possibile comparsa di ipotensione in seguito alla somministrazione di alfuzosina.

Informi imperativamente il suo medico se prende dei medicinali per il cuore o contro l'ipertensione arteriosa.

Erezione prolungata

Se si verifica un'erezione del pene prolungata e dolorosa (priapismo), indipendentemente dall'attività sessuale, consulti il suo medico poiché un insufficiente trattamento del priapismo può portare a un'impotenza permanente.



Presti particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchine, dal momento che i suoi riflessi potrebbero essere rallentati, soprattutto all'inizio del trattamento, in particolare in caso di stordimento o di una caduta della pressione arteriosa.

L'alfuzosina deve essere somministrata solo con prudenza ai pazienti che soffrono di insufficienza renale severa.

Alfuzosina axapharm contiene lattosio. La preghiamo di non assumere Alfuzosina axapharm prima di aver consultato il suo medico se sa di avere un'intolleranza allo zucchero.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Alfuzosina axapharm durante la gravidanza o l'allattamento?

Tenuto conto delle indicazioni, la domanda non ha senso.

Come usare Alfuzosina axapharm?

Si attenga scrupolosamente alle istruzioni del suo medico.

Nel trattamento sintomatico dell'iperplasia benigna della prostata

La dose raccomandata è di una compressa a rilascio ritardato da 10 mg al giorno da assumere preferibilmente dopo un pasto, meglio prima di coricarsi. Non frantumare, masticare, schiacciare o ridurre in polvere le compresse.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Alfuzosina axapharm?

Con l'assunzione d'Alfuzosina axapharm possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Perdita di coscienza/stordimento, mal di testa, debolezza, capogiri, nausea, dolore addominale, malessere, bocca secca.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Vomito, svenimenti/caduta della pressione arteriosa al momento di alzarsi, disturbi della vista, palpitazioni, tachicardia, dolori al petto, gonfiore a livello delle braccia o delle gambe, sensazione di prurito, eruzione cutanea, diarrea, arrossamento, raffreddore.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Sonnolenza.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10'000)

Gravi reazioni cutanee (sindrome di Lyell) che possono manifestarsi con eruzioni cutanee generalizzate e febbre, disturbi dell'irrorazione sanguigna del cervello (nei pazienti con preesistente calcificazione delle arterie del cervello), senso di oppressione toracica e dolori al petto (nei pazienti con malattia cardiaca coronarica preesistente), gonfiori nella zona del viso (angioedema), aritmie cardiache, orticaria.



Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

In caso di erezione prolungata e dolorosa (senza eccitazione sessuale), informi immediatamente il suo medico.

Carenza di piastrine nel sangue, malattia del fegato (danneggiamento delle cellule del fegato, ittero). È stato riportato che alfuzosina può causare complicazioni durante un intervento agli occhi (in caso di opacizzazione del cristallino (cataratta) o aumento della pressione interna dell'occhio (glaucoma)).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP.» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Alfuzosina axapharm?

Una compressa a rilascio ritardato contiene:

Principi attivi

10 mg d'alfuzosina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), povidone K25, magnesio stereato (E470b).

Numero dell'omologazione

59415 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Alfuzosina axapharm? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Compresse a rilascio ritardato a 10 mg: scatola da 10, 30 e 90 compresse a rilascio ritardato.

Titolare dell'omologazione

axapharm ag, 6340 Baar.



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

30100p-09

