

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione

Medicamento omeopatico

Quando si usa Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione può essere usato su prescrizione del suo medico in caso d'infezioni purulenti della pelle.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può usare Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione.

Quando non si può usare Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione e quando il suo uso richiede prudenza?

Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione non può essere usato in caso di allergia conosciuta alla penicillina e sostanze simili. Non sono disponibili esperienze sufficientemente documentate riguardo all'uso di Notakehl D5/D6/D7 soluzione per iniezione nei bambini e negli adolescenti. Pertanto, il suo uso in bambini e adolescenti non è raccomandato.

Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione?

Posologia / uso per gli adulti:

Iniettare 1 fiala di 1 mL 2 volte per settimana per via intramuscolare, endovenosa, sottocutanea o intracutanea. Finora non sono stati ancora studiati l'utilizzo e la sicurezza di Notakehl D5/D6/D7 soluzione per iniezione nei bambini e negli adolescenti.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Notakehl ® D5/D6/D7, soluzione per iniezione?

In seguito all' applicazione di Notakehl® D5/D6/D7, soluzione per iniezione possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Molto raramente reazioni di ipersensibilità (allergia alla penicillina e sostanze simili). Se osserva effetti collaterali non menzionati, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l' applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Notakehl ® D5/D6/D7, soluzione per iniezione e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Notakehl ® D5/D6/D7, soluzione per iniezione?

Penicillium notatum (syn: Penicillium chrysogenum) D5 risp. D6 risp. D7 aquos. dilutio (HAB, 5b, 11). Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie: acqua, cloruro di sodio.

Numero dell'omologazione

50295 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Notakehl ® D5/D6/D7, soluzione per iniezione? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.
Confezioni da 1, 10 e 50 fiale.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2005 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

