

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Mucedokehl D4, capsules

Médicament homéopathique

Quand Mucedokehl D4, capsules est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Mucedokehl D4, capsules peut être utilisé sur ordonnance en cas d'inflammations chroniques des sinus maxillaires et frontaux et de l'oreille moyenne ainsi qu'en cas de troubles nerveux.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Mucedokehl D4, capsules peut être pris simultanément.

Quand Mucedokehl D4, capsules ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Mucedokehl D4, capsules peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Mucedokehl D4, capsules?

Sauf prescription contraire du médecin prendre les adultes 1–3 capsules avant le petit déjeuner ou le soir avant le coucher, avec un peu de liquide.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. L'utilisation et la sécurité de Mucedokehl D4, capsules n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans.

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Mucedokehl D4, capsules peut-il provoquer?



Aucun effet secondaire de Mucedokehl D4, capsules n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez d'effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Mucedokehl D4, capsules et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu' au:» sur le récipient. Garder médicament hors de la portée des enfants. Garder à la température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Mucedokehl D4, capsules?

Une capsule contient:

330 mg Mucor mucedo D4 trituratio (HAB, prescription 6), Hypromellose.

Cette préparation contient en outre un excipient: Lactose.

Numéro d'autorisation

50410 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Mucedokehl D4, capsules? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 20 capsules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2002 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

