

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Umckaloabo[®], compresse rivestite con film

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Umckaloabo e quando si usa?

Umckaloabo è un medicinale a base di erbe e contiene un estratto delle radici di *Pelargonium sidoides*. Umckaloabo viene usato per il trattamento sintomatico della bronchite acuta (infiammazione dei bronchi).

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se la tosse dovesse durare per oltre 7 giorni, in caso di febbre persistente per diversi giorni, in caso di disturbi della funzione epatica, quali colorazione gialla della pelle o della parte bianca degli occhi, urine scure, forti dolori all'addome superiore, perdita dell'appetito come pure in caso di insufficienza respiratoria o espettorato ematico si deve consultare un medico o un farmacista.

Quando non si può assumere Umckaloabo e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Umckaloabo non può essere usato:

- in caso di ipersensibilità nota al principio attivo o ad altre componenti del medicamento,
- in caso di gravi affezioni epatiche.

Prudenza in caso di elevata tendenza all'emorragia come pure d'impiego di anticoagulanti (anticoagulanti orali quali warfarina, fenprocoumon).

L'uso di Umckaloabo compresse rivestite con film non è destinato a bambini inferiore ai 12 anni.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Umckaloabo. Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può assumere Umckaloabo durante la gravidanza o l'allattamento?

Per prudenza si dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo di allattamento, poiché al riguardo non sono ancora state fatte sufficienti esperienze.

Come usare Umckaloabo?

Salvo diversa prescrizione, adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni assumono 1 compressa rivestita con film 3 volte al giorno (mattina, mezzogiorno e sera) con un po' di liquido.

L'uso di Umckaloabo compresse rivestite con film non è destinato a bambini inferiore ai 12 anni.



Si raccomanda di continuare il trattamento per diversi giorni dopo che i sintomi della malattia si sono attenuati per evitare una ricaduta.

La durata del trattamento non deve superare le 3 settimane.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Umckaloabo?

Occasionalmente possono insorgere disturbi gastrointestinali (quali ad es. dolori allo stomaco, bruciori di stomaco, nausea, diarrea). In casi rari si possono verificare lievi emorragie gengivali o nasali (epistassi). Raramente sono state inoltre descritte reazioni di ipersensibilità (eruzioni cutanee, orticaria, prurito cutaneo e alle mucose). Tali reazioni possono manifestarsi già dopo la prima utilizzazione del medicamento.

In casi rarissimi possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità grave con tumefazione del viso, difficoltà respiratoria (dispnea) e diminuzione della pressione arteriosa.

Frequenza non nota: Ci sono state indicazioni di disturbi delle funzioni epatiche, la cui relazione con l'assunzione di Umckaloabo non è però stata accertata.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30°C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Umckaloabo?

1 compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo

20 mg di estratto liquido disidratato di radici di pelargonio (*Pelargonium sidoides* DC, radix), rapporto droga/estratto 1:8–10, solvente di estrazione: etanolo 11 % (m/m).

Sostanze ausiliarie

Cellulosa microcristallina, maltodestrina, lattosio monoidrato (20 mg), croscarmellosa sodica (equivalente a 0,55 mg di sodio), magnesio stearato, biossido di silicio precipitato, ipromellosa, macrogol 1500, talco, simeticone, metilcellulosa, acido sorbico (E 200), ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro rosso (E 172), biossido di titanio (E 171).

Numero dell'omologazione



61350 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Umckaloabo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 30 e 60 compresse rivestite con film.

Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

