

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Cuprukehl® D4, solution pour injection

Médicament homéopathique

Quand Cuprukehl® D4, solution pour injection est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Cuprukehl® D4, solution pour injection peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas d'inflammations de l'estomac, de l'intestin et des reins.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Cuprukehl® D4, solution pour injection peut être utilisé simultanément.

Quand Cuprukehl® D4, solution pour injection ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser pour les enfants et les adolescences de moins de 18 ans. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Cuprukehl® D4, solution pour injection peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Cuprukehl® D4, solution pour injection?

Posologie / mode d'emploi chez des adultes:

Injecter 1 fois par jour 2 mL soit par voie intramusculaire, intraveineuse, sous-cutanée ou intra-cutanée.

L'utilisation et la sécurité de Cuprukehl® D4, solution pour injection n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans.

Quels effets secondaires Cuprukehl® D4, solution pour injection peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez d'effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette



aggravation persiste, cessez le traitement avec Cuprukehl® D4, solution pour injection et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder le médicament hors de la portée des enfants. Garder à la température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Cuprukehl® D4, solution pour injection?

Une ampoule de 2 mL contient:

2 mL gluconate de cuivre D4 aquos dilutio (HAB; 5a, 11) chlorure de sodium comme excipient.

Numéro d'autorisation

50242 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Cuprukehl® D4, solution pour injection? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 10 et de 50 ampoules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

