Informazione destinata ai pazienti
Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione

Medicamento omeopatico

Quando si usa Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici Cuprukehl D4, soluzione per iniezione può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di processi infiammatori dello stomaco, dell'intestino e dei reni.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione.

Quando non si può usare Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione e quando il suo uso richiede prudenza?

. Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 sotto i 18 anni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente. Informi il suo medico o il suo farmacista se

– soffre di altre malattie
– soffre di allergie o
– assume o applica esternamente altri medicamenti (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione?

Posologia/uso negli adulti:
Iniettare 1 volta al giorno 2 mL per via intramuscolare, endovenosa, sottocutanea o intracutanea. L'uso e la sicurezza dell Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 finora non sono stati esaminati.

Quali effetti collaterali può avere Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione. Se osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'uso di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?
Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione?
1 fiala di 2 mL contiene:
2 mL gluconato di rame D4 aquos. dilutio (HAB; 5a,11), cloruro di sodio come sostanza ausiliaria.

Numero dell'omologazione
50242 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Cuprukehl® D4, soluzione per iniezione? Quali confezioni sono disponibili?
In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.
Confezioni da 10 / 50 fiale da 2 mL.

Titolare dell'omologazione
ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2004 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).