

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sanukehl Klebs D6, gocce da ingerire e da frizionare

Medicamento omeopatico

Quando si usa Sanukehl Klebs D6?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Sanukehl Klebs D6 può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di sinusite, tracheite e bronchite.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere/usare Sanukehl Klebs D6.

Quando non si può assumere/usare Sanukehl Klebs D6 e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

- Se è nota la sua ipersensibilità alle specie *Klebsiella* o *Klebsiella pneumoniae*
- Malattie autoimmuni
- Bambini e giovani sotto i 18 anni
- Donne in gravidanza e in allattamento

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può assumere / usare Sanukehl Klebs D6 durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare Sanukehl Klebs D6?

Posologia/uso, negli adulti:

Da prendere: in casi acuti 5 – 10 gocce ogni 12 – 24 ore prima di un pasto, in casi cronici 10 gocce ogni 48 ore prima di un pasto.

Da frizionare: 5 – 10 gocce ogni 1 – 2 giorni sulla parte colpita o al di sopra del gomito.



Finora non sono stati ancora studiati l'utilizzo e la sicurezza di Sanukehl Klebs D6 nei bambini e negli adolescenti. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista. Sanukehl Klebs D6 deve essere interrotto dopo un massimo di 4 settimane di terapia.

Quali effetti collaterali può avere Sanukehl Klebs D6?

A causa del contenuto di componenti organici specifici in Sanukehl Klebs D6, possono verificarsi reazioni di ipersensibilità, principalmente sotto forma di reazioni cutanee e può scatenarsi un'allergia al componente *Klebsiella pneumoniae*. In tal caso è necessario interrompere la somministrazione del medicinale e consultare un medico.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Sanukehl Klebs D6 e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Massimo 2 mesi

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sanukehl Klebs D6?

1 ml di liquido (22 gocce) contiene:

Principi attivi

Klebsiella pneumoniae extractum cellulae (lyophil., steril.) D6 (HAB 5a) 1 ml

Sostanze ausiliarie

acqua purificata

Numero dell'omologazione

53404 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Sanukehl Klebs D6? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 ml.

Titolare dell'omologazione



ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

