

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Spersapolymyxin®

OmniVision AG

Che cos'è Spersapolymyxin e quando si usa?

Spersapolymyxin gocce oftalmiche contengono due antibiotici che si completano a vicenda. In caso di infezioni degli occhi dovute a batteri, Spersapolymyxin uccide i germi patogeni e favorisce così la guarigione. Spersapolymyxin si può usare solamente su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Gli antibiotici contenuti in Spersapolymyxin non agiscono contro tutte le infezioni degli occhi. L'uso di un antibiotico scelto in modo inappropriato oppure a dosi sbagliate può provocare delle complicazioni. Perciò non lo usi per trattare altre malattie o terze persone.

Se contemporaneamente con Spersapolymyxin deve usare anche altri medicinali nell'occhio, parli con il suo medico curante per poter stabilire un piano di somministrazione ottimale dei singoli medicinali.

Avvertenza per chi porta lenti a contatto

Durante la terapia con Spersapolymyxin si sconsiglia di portare lenti a contatto a causa del rischio di propagazione di germi. Il benzalconio cloruro contenuto in Spersapolymyxin può provocare irritazioni agli occhi.

Quando non si può usare Spersapolymyxin?

In caso di allergia ad uno dei principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Spersapolymyxin.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Spersapolymyxin?

Se dopo 2–3 giorni di terapia i disturbi agli occhi trattati con Spersapolymyxin peggiorano oppure si manifestano dei sintomi nuovi, consulti subito il suo medico.

Dato che immediatamente dopo l'applicazione di Spersapolymyxin può manifestarsi un offuscamento transitorio della vista, non guidi veicoli e non adoperi macchine finché questo disturbo non si è risolto. L'uso e la sicurezza di Spersapolymyxin gocce oftalmiche nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Non somministri a bambini al di sotto dei 12 anni di età poiché questo medicamento contiene boro e in futuro può compromettere la fertilità.

Età	Limite di sicurezza	Dose massima giornaliera
< 2 anni	1 mg boro/giorno	10 gocce/giorno
< 12 anni	3 mg boro/giorno	28 gocce/giorno
< 18 anni*	7 mg boro/giorno	64 gocce/giorno
≥18 anni*	10 mg boro/giorno	92 gocce/giorno



* Questa quantità può anche essere nociva per il feto.

Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore.

Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi, specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicamento, parli con il medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie;
- soffre di allergie o
- assume o applica agli occhi altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Spersapolymyxin durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza o l'allattamento questo medicamento va usato soltanto su esplicita prescrizione del medico!

Come usare Spersapolymyxin?

Nelle infezioni da lievi a moderate 1 goccia ogni 1–2 ore finché i sintomi dell'infiammazione non regrediscono visibilmente. Per la dose massima giornaliera vedere «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Spersapolymyxin?». Continuare il trattamento instillando una goccia 2–3 volte al giorno nel sacco congiuntivale dell'occhio. Con la testa piegata all'indietro e tenendo con una mano il flaconcino contagocce verticalmente sopra l'occhio, tirare leggermente con l'altra mano la palpebra inferiore verso il basso e, premendo sul flaconcino, far cadere una goccia nella metà del sacco congiuntivale situata verso il naso (evitare che l'estremità del contagocce venga a contatto con l'occhio).

L'uso e la sicurezza di Spersapolymyxin gocce oftalmiche nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Per questa ragione non si possono consigliare dei dosaggi specifici.

Si attenga alla posologia prescritta dal suo medico. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Spersapolymyxin?

Durante l'uso di Spersapolymyxin possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1'000)

Bruciore temporaneo subito dopo l'instillazione.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Ipersensibilità, reazione cutanea grave (sindrome de Stevens-Johnson e necrolisi epidermica tossica).

Se si manifesta un qualsiasi sintomo (p. es. arrossamento, gonfiore, prurito o sensazione di corpo estraneo) che pensa sia dovuto all'uso di questo medicamento, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

I principi attivi contenuti nei preparati per uso oftalmico possono entrare nella circolazione sanguigna. Perciò sono possibili anche effetti collaterali nell'organismo.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.



Termine di consumo dopo l'apertura

Chiudere bene il flaconcino dopo l'uso. Dopo averlo aperto per la prima volta, non usarlo per più di un mese.

Al termine del trattamento consegni il medicamento rimasto presso il punto in cui l'ha ricevuto (medico o farmacista) per un adeguato smaltimento.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, in frigorifero (2–8 °C), e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Per preservare la sterilità delle gocce oftalmiche, l'estremità del contagocce non deve venire a contatto né con le mani né con gli occhi.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Spersapolymyxin?

1 ml di gocce oftalmiche, soluzione contiene:

Principi attivi

1,5 mg di polimixina B solfato e 3,5 mg di neomicina (sotto forma di neomicina solfato).

Sostanze ausiliarie

Acido borico (E 284), borace (E 285), ipromellosa, benzalconio cloruro e acqua depurata.

Numero dell'omologazione

36'290 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Spersapolymyxin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica non rinnovabile.

Flaconcino contagocce da 5 ml.

Titolare dell'omologazione

OmniVision AG, 8212 Neuhausen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

