

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

La pommade du Dr. Brand

Qu'est-ce que la pommade du Dr. Brand et quand doit-elle être utilisée?

La pommade du Dr. Brand protège la peau, stimule la guérison de blessures, de brûlures et d'inflammations.

La pommade du Dr. Brand s'utilise:

Pour le traitement de petites blessures de toute nature, telle que:

- écorchures, légères lésions de la peau
- irritations cutanées, légères brûlures (y compris celles occasionnées par les rayons
- coups de soleil (y compris ceux provenant lampes ultraviolets)
- gerçures et crevasses aux mains et aux pieds

Pour la prophylaxie et guérison d'escarres.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas de grandes et profondes blessures, de blessures fortement contaminées et lors d'une morsure ou une piqûre consultez un médecin (danger de tétanie). Si en 10- 14 jours la grandeur de la blessure reste inchangée ou ne guérit pas c'est indispensable de consulter le médecin. Autant les lèvres de la blessure rougissent fortement ou la blessure se gonfle ou déviant douloureuse ou est accompagnée de fièvre, veuillez consulter le médecin (danger de septicémie).

Quand la pommade du Dr. Brand ne doit-elle pas être utilisée?

En cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants du produit pharmaceutique, la pommade du Dr. Brand ne doit pas être utilisée. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !) ou



utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe !

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de la pommade du Dr. Brand?

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. A ce jour, l'utilisation et la sécurité d'emploi de la pommade du Dr. Brand chez les enfants n'ont pas été testées.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

La pommade du Dr. Brand peut-elle être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser la pommade du Dr. Brand?

Plaies et petites brûlures (y inclus coup de soleil)

Appliquer sur la blessure, en la recouvrant d'une couche épaisse de pommade du Dr. Brand. Si besoin, protéger le tout par une compresse de gaze ou de toile.

Crevasses aux mains

Après un bain tiède, frictionner soigneusement la peau.

Pieds blessés

Après un lavage à l'eau froide, bien frictionner les pieds, éventuellement les bander.

Veillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'effet du médicament est trop faible ou au contraire trop fort, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

A ce jour, l'utilisation et la sécurité d'emploi de la pommade du Dr. Brand chez les enfants n'ont pas été testées.

Quels effets secondaires la pommade du Dr. Brand peut-elle provoquer?

L'utilisation de la pommade du Dr. Brand peut provoquer les effets secondaires suivants:



Peau: Dans des cas rares, des réactions d'hypersensibilité ont été observées.

Si vous constatez des réactions imprévues de la peau ou des effets secondaires qui ne sont pas décrits ici, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Conserver à température ambiante (15-25°C). Conserver hors de la portée des enfants.

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient par "EXP".

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient la pommade de Dr. Brand?

1g de pommade contient:

Principe actif: oxyde de zinc 24mg, nitrate de bismuth 4,2mg.

Excipients: Amidon de blé, graisse de laine, arôme: vanilline et autres excipients.

Numéro d'autorisation

17664 (Swissmedic)

Où obtenez-vous la pommade du Dr. Brand? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

La pommade du Dr. Brand est en vente en pharmacie et droguerie sans ordonnance médicale. Tube de 50g.

Titulaire de l'autorisation

Bären-Apotheke AG, 8003 Zurich.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2015 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

