

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Lamisil Pedisan Once, solution pour application cutanée

Medius AG

Qu'est-ce que Lamisil Pedisan Once et quand doit-il être utilisé?

Lamisil Pedisan Once, solution pour application cutanée est un médicament destiné à être appliqué en une seule fois, pour le traitement des mycoses des pieds. La préparation contient le principe actif terbinafine. Après l'utilisation de la solution filmogène, un film incolore reste sur les pieds. Le principe actif pour le traitement de la mycose du pied est libérée dans la peau à partir de ce film.

Il supprime les symptômes généraux des mycoses des pieds tels que démangeaisons, desquamations et rougeurs.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Afin de prévenir les mycoses des pieds, observez les règles suivantes:

- Changer les chaussettes tous les jours.
- Eviter de porter des chaussures trop justes.
- Sécher soigneusement les parties atteintes après le lavage.
- Changer tous les jours les serviettes.
- Ne pas marcher pieds nus. De plus, saupoudrer ou vaporiser chaque jour l'intérieur de vos chaussettes et de vos chaussures avec une poudre ou un spray efficace contre les mycoses.
- Se laver les mains soigneusement après utilisation et après contact avec les parties cutanées atteintes afin de prévenir la propagation de l'infection fongique.

Quand Lamisil Pedisan Once ne doit-il pas être utilisé?

Lamisil Pedisan Once ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au principe actif, la terbinafine, ou à l'un des excipients (voir «Que contient Lamisil Pedisan Once?»).

Chez les enfants et les adolescents de moins de 15 ans:

Lamisil Pedisan Once n'a pas été étudié chez les enfants et les adolescents de moins de 15 ans. En conséquence, l'utilisation de Lamisil Pedisan Once n'est pas recommandée chez les enfants et les adolescents de moins de 15 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Lamisil Pedisan Once?

Lamisil Pedisan Once est réservé uniquement à l'usage externe (ne pas utiliser dans la bouche, ne pas ingérer).

Ne pas utiliser Lamisil Pedisan Once sur le visage. Eviter tout contact avec les yeux. Le contact accidentel avec les yeux peut provoquer une irritation des yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux quand même, il faut immédiatement et soigneusement rincer les yeux sous l'eau courante.

Consultez votre médecin si d'éventuels troubles persistent.

Lamisil Pedisan Once doit être utilisé avec précaution sur la peau lésée (par exemple après une exposition au soleil, en cas de desquamation grave et/ou de peau crevassée), car il contient de l'alcool qui peut provoquer des irritations.



Lors de mycoses importantes, en cas d'infections fongiques de longue durée, ou lorsque la mycose atteint aussi les ongles, une consultation médicale est nécessaire.

Aucun autre médicament ne doit être appliqué sur les zones cutanées traitées pendant le traitement avec Lamisil Pedisan Once.

Lamisil Pedisan Once, solution pour application cutanée contient de l'alcool – tenir à l'écart des flammes.

Les nourrissons et les petits enfants ne doivent pas être en contact avec les zones de peau traitées.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous utilisez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Lamisil Pedisan Once peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Grossesse

Pendant la grossesse, Lamisil Pedisan Once ne doit être utilisé que sur ordonnance médicale expresse.

Si vous pensez être enceinte, ou si vous planifiez une grossesse, vous ne devriez utiliser Lamisil Pedisan Once qu'après avoir consulté votre médecin.

Allaitement

Lamisil Pedisan Once ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement. Les nourrissons et les petits enfants ne doivent pas être en contact avec les zones de peau traitées.

Comment utiliser Lamisil Pedisan Once?

Adultes et adolescents dès 15 ans:

Lamisil Pedisan Once est conçu pour *une application unique*.

- Avant d'appliquer Lamisil Pedisan Once, se laver soigneusement les mains et nettoyer les parties atteintes avec un tampon d'ouate et de l'eau chaude, puis sécher soigneusement.
- Lamisil Pedisan Once doit être appliqué sur les deux pieds afin de traiter et d'éliminer également les mycoses qui ne sont pas visibles à l'oeil nu. Utiliser environ le contenu d'un demi-tube pour chaque pied. Terminer le traitement du premier pied avant de traiter le deuxième.
- Appliquer avec les doigts tout d'abord une fine couche de Lamisil Pedisan Once entre et autour de tous les orteils.



- Appliquer ensuite Lamisil Pedisan Once sur toute la plante du pied ainsi que sur le pourtour du pied en remontant jusqu'à environ 1,5 cm (voir image). Ne pas frotter, ne pas faire pénétrer par massage.
- Traiter l'autre pied de la même manière, même si des lésions cutanées ne sont pas visibles.
- Laisser sécher la solution appliquée pendant 1 à 2 minutes, avant de mettre vos chaussettes et vos chaussures.
- Après l'application se laver soigneusement les mains avec du savon pour empêcher la propagation de l'infection.



- Ne pas appliquer la préparation une deuxième fois.
- Tout médicament non utilisé doit être jeté.

Afin d'obtenir de bons résultats, *laisser agir Lamisil Pedisan Once sur les pieds pendant 24 heures sans rincer*. Lamisil Pedisan Once doit donc de préférence être appliqué après la douche ou le bain.

Si après 1 semaine aucune amélioration n'apparaît, consultez votre médecin.

Enfants et adolescents de moins de 15 ans

L'utilisation et la sécurité d'emploi de Lamisil Pedisan Once chez les enfants et les adolescents de moins de 15 ans n'ont pas été étudiées et n'est donc pas recommandée.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Lamisil Pedisan Once peut-il provoquer?

L'utilisation de Lamisil Pedisan Once peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Desquamation, démangeaisons.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Occasionnellement des rougeurs, des irritations de la peau, troubles pigmentaires, une sensation de brûlure de la peau, douleurs ou irritations peuvent être observées au site d'application.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Peau sèche, eczéma.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Très rarement des réactions allergiques ont été observées.

Informez immédiatement votre médecin, si un ou plusieurs des symptômes suivants apparaissent chez vous; ils peuvent être le signe d'une réaction allergique:

- problèmes respiratoires ou de déglutition,
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou la gorge,
- forte démangeaison de la peau accompagnée d'une éruption rouge ou de vésicules.

En cas d'apparition d'une réaction allergique ou de l'un des symptômes mentionnés ci-dessus, le film doit être retiré avec de l'alcool (disponible en pharmacie) et les pieds doivent être lavés à l'eau chaude et au savon.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à 15-30 °C.

Conserver dans l'emballage d'origine.

Tenir hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Lamisil Pedisan Once?

Principe actif

1 g *Lamisil Pedisan Once*, solution pour application cutanée contient: 10 mg terbinafine en forme de chlorhydrate de terbinafine.

Excipients

Poly(acrylamide-co-isooctylacrylate), triglycérides à chaîne moyenne, hydroxypropylcellulose et éthanol.

Numéro d'autorisation

57223 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Lamisil Pedisan Once? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tube de 4 g.

Titulaire de l'autorisation

Medius AG, 4132 MuttENZ

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

