

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Lamisil Pedisan Once, soluzione cutanea

Medius AG

Che cos'è Lamisil Pedisan Once e quando si usa?

Lamisil Pedisan Once, soluzione cutanea è un medicamento monouso per il trattamento delle micosi ai piedi. Il preparato contiene il principio attivo terbinafina. Dopo l'applicazione della soluzione filmogena rimane una pellicola trasparente sui piedi. Da questa pellicola viene rilasciato nella pelle il principio attivo per il trattamento della micosi ai piedi.

Lamisil Pedisan Once calma i sintomi generali delle micosi ai piedi quali prurito, desquamazione e arrossamento.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Per prevenire in modo efficace una micosi ai piedi, occorre rispettare alcune regole:

- Cambiare ogni giorno le calze.
- Evitare di portare delle scarpe troppo aderenti.
- Una volta lavata, asciugare accuratamente la pelle malata.
- Cambiare ogni giorno gli asciugamani.
- Non camminare a piedi nudi; cospargere ogni giorno le calze e l'interno delle scarpe con un talco o uno spray antimicotico.
- Lavarsi le mani con cura dopo l'utilizzo e dopo il contatto con parti cutanee infette, per evitare di estendere l'infezione micotica.

Quando non si può usare Lamisil Pedisan Once?

Lamisil Pedisan Once non può essere usato in caso di nota ipersensibilità al principio attivo terbinafina o ad una delle sue sostanze ausiliarie (vedi «Cosa contiene Lamisil Pedisan Once?»).

Nei bambini e adolescenti sotto i 15 anni:

L'uso di Lamisil Pedisan Once finora non è stato esaminato nei bambini e adolescenti sotto i 15 anni. Per questa ragione l'uso di Lamisil Pedisan Once nei bambini e adolescenti al di sotto dei 15 anni non è raccomandato.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lamisil Pedisan Once?

Lamisil Pedisan Once è indicato solo per uso esterno (non applicare in bocca, non ingerire).

Non applicare Lamisil Pedisan Once sul viso; non deve entrare a contatto con gli occhi. Contatto accidentale con gli occhi può causare irritazione agli occhi. Tuttavia, in caso di contatto con gli occhi, occorre lavarli accuratamente con acqua corrente.

Consulti il suo medico se gli eventuali disturbi non svaniscono.

Lamisil Pedisan Once dev'essere usato con precauzione sulla pelle lesionata (per es. dopo esposizione solare, in caso di grave desquamazione e/o pelle screpolata), perché l'alcool contenuto nel preparato può provocare delle irritazioni.



Se le micosi sono estese, se l'infezione micotica è persistente oppure se anche le unghie sono infette, bisogna consultare il medico.

Durante il trattamento con Lamisil Pedisan Once, non applicare altri medicinali sulle zone cutanee trattate.

Lamisil Pedisan Once, soluzione cutanea contiene alcool: tenere lontano da fiamme libere.

Neonati e bambini non devono entrare in contatto con le zone cutanee trattate.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Lamisil Pedisan Once durante la gravidanza o l'allattamento?

Gravidanza

Durante la gravidanza, Lamisil Pedisan Once non può essere usato, se non dopo esplicita prescrizione medica. Se sospetta di essere in stato di gravidanza o sta pianificando una gravidanza, consulti il medico prima di usare Lamisil Pedisan Once.

Allattamento

Durante l'allattamento, Lamisil Pedisan Once non può essere usato. Neonati e bambini non devono entrare in contatto con le zone cutanee trattate.

Come usare Lamisil Pedisan Once?

Adulti e adolescenti dai 15 anni:

Lamisil Pedisan Once è destinato per *un'applicazione unica*.

- Prima di utilizzare Lamisil Pedisan Once lavarsi le mani con cura. Le zone malate devono essere pulite a fondo con un batuffolo di ovatta imbevuto di acqua calda, quindi asciugate accuratamente.
- Lamisil Pedisan Once va utilizzato su entrambi i piedi in modo da curare ed eliminare la micosi anche dove è invisibile. Utilizzare per ciascun piede circa la metà del contenuto del tubetto. Terminare il trattamento di un piede prima di cominciare il trattamento dell'altro.
- Applicare inizialmente con le dita un sottile strato di Lamisil Pedisan Once tra e intorno a tutte le dita dei piedi.



- Applicare poi Lamisil Pedisan Once su tutta la pianta del piede e verso l'alto fino a circa 1,5 cm sul piede (vedere immagine). Non frizionare né massaggiare.
- Trattare l'altro piede allo stesso modo, anche se non sono visibili lesioni cutanee.
- Lasciar asciugare la soluzione applicata per 1 o 2 minuti, prima di indossare calze e scarpe.
- Lavarsi bene le mani con il sapone dopo l'uso per evitare la diffusione dell'infezione.
- Non applicare il preparato una seconda volta.
- Gettare il medicamento non utilizzato.



Per ottenere buoni risultati è necessario *lasciare* Lamisil Pedisan Once *per 24 ore sui piedi* senza risciacquare. Lamisil Pedisan Once va pertanto applicato preferibilmente dopo il bagno o la doccia.

Se dopo 1 settimana non si vede nessun miglioramento, bisogna consultare il medico.

Bambini e adolescenti sotto i 15 anni:

L'uso e la sicurezza di Lamisil Pedisan Once non sono stati esaminati nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 15 anni e pertanto non è raccomandato.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Lamisil Pedisan Once?

Con l'applicazione di Lamisil Pedisan Once possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Forfora, prurito.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Occasionalmente possono svilupparsi arrossamenti, irritazioni cutanee, disturbi della pigmentazione, bruciore della pelle, dolore o irritazione nelle zone di applicazione.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Secchezza cutanea, eczema.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Molto raramente sono state osservate reazioni allergiche.

Informi immediatamente il medico se si manifestano uno o più di questi sintomi, che possono essere segni di una reazione allergica:

- problemi respiratori o di deglutizione,
- gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola,
- forte prurito cutaneo con eruzione cutanea rossa o vesciche.

Se sviluppa una reazione allergica o uno dei sintomi di cui sopra, rimuovere immediatamente la pellicola con alcool (disponibile in farmacia) e lavare i piedi con acqua calda e sapone.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare tra 15-30 C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Lamisil Pedisan Once?

Principio attivo



1 g di *Lamisil Pedisan Once*, soluzione cutanea contiene: 10 mg di terbinafina su forma d'idrocloruro.

Sostanze ausiliarie

Poli (acrilammide-co-isooctilacrilato), trigliceridi a catena media, idrossipropilcellulosa ed etanolo.

Numero dell'omologazione

57223 (Swissmedic).

Dove è ottenibile *Lamisil Pedisan Once*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubetto da 4 g.

Titolare dell'omologazione

Medius AG, 4132 MuttENZ

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

