

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Engystol N, Solution injectable (i.m., s.c., i.c., i.v.)

Médicament homéopathique

Quand Engystol N est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Engystol N peut être utilisé sur prescription de votre médecin en cas de symptômes grippaux.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Engystol N peut être utilisé simultanément.

Quand Engystol N ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par ampoule, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium». Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication)!

Engystol N peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Comment utiliser Engystol N?

Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Posologie / mode d'emploi:

Posologie standard: adultes et adolescents à partir de 12 ans: 1 ampoule 1 à 3 fois par semaine.

Posologie aiguë: adultes et adolescents à partir de 12 ans: 1 ampoule par jour, puis poursuivre avec la posologie standard.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.



Le médicament ne doit pas être utilisé pendant plus de 4 semaines.

Engystol N peut être injecté par voie i.m., s.c., i.c. ou i.v.

Instructions pour l'ouverture d'une ampoule



Ouvrez l'ampoule avec précaution! Veuillez suivre les instructions.

Il n'est pas nécessaire de sectionner l'ampoule en verre pour l'ouvrir. Tenez l'ampoule en inclinant la partie supérieure de l'ampoule vers le haut et laissez s'écouler la solution qu'elle contient vers le bas en tapotant ou en agitant l'ampoule. Détachez ensuite la tête de l'ampoule en exerçant une pression sur le point de couleur. Toute ampoule entamée doit être éliminée.

Quels effets secondaires Engystol N peut-il provoquer?

L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Engystol N et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

Aucun effet secondaire de Engystol N n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'à» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Engystol N?

1 ampoule à 1,1 ml de liquide contient:

Principes actifs

Sulfur (HAB) D4 (HAB SV) 3,30 mg

Sulfur (HAB) D10 (HAB SV) 3,30 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D6 6,60 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D10 6,60 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D30 6,60 mg

Excipients



Chlorure de sodium (correspond à 3,46 mg de sodium), eau pour injection.

Numéro d'autorisation

41436 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Engystol N? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 10 et 100 ampoules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

