

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Engystol N, Soluzione iniettabile (i.m., s.c., i.c., i.v.)

Medicamento omeopatico

Quando si usa Engystol N?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Engystol N può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di sintomi influenzali.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Engystol N.

Quando non si può usare Engystol N e quando il suo uso richiede prudenza?

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per fiala, cioè essenzialmente "senza sodio". Non usare nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può usare Engystol N durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare Engystol N?

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Posologia/Uso:

Dosaggio standard: adulti e adolescenti a partire dai 12 anni: 1 fiala, da 1 a 3 volte alla settimana.

Dosaggio acuto: adulti e adolescenti a partire dai 12 anni: 1 fiala al giorno, successivamente proseguire con il dosaggio standard.

Non usare nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

Si consiglia di non usare il preparato per più di 4 settimane. Engystol N può essere iniettato per via i.m., s.c., i.c., i.v.



Istruzioni per l'apertura delle fiale



Aprire le fiale con prudenza! Si prega di seguire le istruzioni.

Non occorre tagliare la fiala di vetro. Tenga la fiala con l'estremità superiore obliquamente verso l'alto e lasci che la soluzione contenuta si sposti verso il basso picchiando la fiala o scuotendola. Distacchi la testa della fiala, esercitando una pressione sul punto colorato. Le fiale usate parzialmente vanno eliminate.

Quali effetti collaterali può avere Engystol N?

Con l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Engystol N e informi il suo medico o il suo farmacista.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Engystol N. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "Verwendbar bis" sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Engystol N?

1 fiala da 1,1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

Sulfur (HAB) D4 (HAB SV) 3,30 mg

Sulfur (HAB) D10 (HAB SV) 3,30 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D6 6,60 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D10 6,60 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D30 6,60 mg

Sostanze ausiliarie

Cloruro di sodio (equivalente a 3,46 mg di sodio), acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

41436 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Engystol N? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 10 e 100 fiale.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

