

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Viscotears SDU

Bausch & Lomb Swiss AG

Che cos'è Viscotears SDU, gel oftalmico e quando si usa?

Viscotears SDU gel oftalmico è un gel limpido e che si può instillare. Dopo l'instillazione si ripartisce rapidamente sulla congiuntiva e sulla cornea e stabilizza per lungo tempo il film lacrimale dell'occhio, senza che si manifesti tendenza alla formazione di croste, alleviando così il bruciore, il prurito e la sensazione di «granelli di sabbia negli occhi».

Viscotears SDU si utilizza per umettare gli occhi e per bagnarli quando sono irritati. Viscotears SDU si può anche utilizzare per umettare protesi oculari.

Su consiglio del farmacista o su prescrizione del medico Viscotears SDU si usa anche in caso di secchezza degli occhi dovuta a cause diverse.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Avvertenza per chi porta lenti a contatto:

Se porta lenti a contatto, prima di instillare Viscotears SDU gel oftalmico le tolga e le rimetta al più presto 15 minuti dopo aver instillato il medicamento.

Quando non si può assumere/usare Viscotears SDU, gel oftalmico?

In caso di ipersensibilità ad uno dei componenti di Viscotears SDU.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Viscotears SDU, gel oftalmico?

Se entro 2-3 giorni non è subentrato un miglioramento si consiglia di consultare il medico. Se si ha addirittura un peggioramento o se si manifestano nuovi disturbi (p.es. una diminuzione dell'acuità visiva, irritazioni oculari, arrossamento persistente agli occhi) bisogna consultare il medico senza indugio.

Occasionalmente si manifestano disturbi visivi di breve durata, finché il gel si è ripartito uniformemente sulla superficie dell'occhio. Anche usato secondo le prescrizioni, Viscotears SDU gel oftalmico influisce transitoriamente sull'acuità visiva e di conseguenza riduce la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma o applichi agli occhi altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere/usare Viscotears SDU, gel oftalmico durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino, se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.


Come usare Viscotears SDU, gel oftalmico?

Adulti:

La frequenza delle applicazioni dipende dalla necessità. Di regola si instilla 1 goccia 3-4 volte al giorno nel sacco congiuntivale dell'occhio. In caso di bisogno Viscotears SDU gel oftalmico si può usare anche più



spesso.



Stacchi una dose singola dalla striscia, scuota il contenuto in avanti e apra la dose staccando la punta del tubetto. Con la testa piegata all'indietro, tenga con una mano il tubetto il più possibile verticalmente sopra l'occhio e contemporaneamente, con l'altra mano tiri leggermente verso il basso la palpebra inferiore. Premendo con cautela sul tubetto faccia ora cadere la goccia nel sacco congiuntivale, evitando di toccare l'occhio. Se necessario, trattare l'altro occhio con la stessa dose singola. Non conservare i residui non utilizzati ed eliminare la dose singola dopo l'uso.

Bambini e adolescenti:

L'uso e la sicurezza di Viscotears nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Se contemporaneamente a Viscotears SDU gel oftalmico deve usare anche altri medicinali per gli occhi ne parli col medico curante. Tra le applicazioni nell'occhio di ciascuno dei medicinali bisogna rispettare un intervallo di almeno 5 minuti e instillare sempre per ultimo Viscotears SDU gel oftalmico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Viscotears SDU, gel oftalmico?

Durante l'uso di Viscotears possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Palpebre appiccicate (nel 12% dei pazienti) e/o vista sfocata immediatamente dopo l'applicazione (nel 16% dei pazienti).

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Fastidio oculare, croste lungo i margini palpebrali, irritazione oculare (nel 4% dei pazienti).

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Prurito o dolore all'occhio, palpebre gonfie, arrossamento dell'occhio, dermatite da contatto e aumento della lacrimazione.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Ipersensibilità a uno dei componenti.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.



Di che altro occorre tener conto?

Stabilità:

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Termine di consumo dopo l'apertura

Usare le dosi singole subito dopo l'apertura e quindi eliminarle.

Non conservare le dosi singole una volta aperte.

Istruzioni di conservazione:

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C). Dopo l'uso, riporre nella scatola le dosi singole non utilizzate. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Viscotears SDU, gel oftalmico?

1 g di gel oftalmico contiene:

Principi attivi

Carbomer 980 2,0 mg

Sostanze ausiliarie

Sorbitolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili

Numero dell'omologazione

56087 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Viscotears SDU, gel oftalmico? Quali confezioni sono disponibili?

Ottenibile in farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Confezioni da 3× 10 dosi singole a 0.6 g. Viscotears è disponibile anche in tubetti da 10 g (contiene conservanti).

Titolare dell'omologazione

Bausch & Lomb Swiss SA, 6301 Zug.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

