

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Scheriproct®

Medius AG

Che cos'è Scheriproct e quando si usa?

Scheriproct è un preparato indicato per il trattamento delle infiammazioni anali. Esplica un'azione antinfiammatoria, antiallergica, antipruriginosa e anestetica. Il notevole effetto anestetico facilita l'evacuazione delle feci.

Scheriproct viene impiegato in caso di emorroidi, ragadi anali superficiali e infiammazione della mucosa rettale.

Scheriproct deve essere impiegato solo dietro prescrizione medica e sotto stretto controllo medico.

Quando non si può usare Scheriproct?

In caso di ipersensibilità a uno dei principi attivi o a una delle sostanze ausiliarie di Scheriproct. Scheriproct non deve essere impiegato in caso di lesioni cutanee specifiche (sifilide, tubercolosi) nella zona da trattare e in caso di infiammazioni nella regione anale dovute ad infezioni virali o a vaccini.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Scheriproct?

In caso di micosi è necessario affiancare questo trattamento ad una terapia specifica antimicotica. Evitare che Scheriproct entri in contatto con gli occhi. Si raccomanda di lavarsi bene le mani dopo l'uso.

Se nella zona trattata con Scheriproct vengono usati contemporaneamente prodotti contenenti lattice come i profilattici, determinate sostanze potrebbero danneggiare il prodotto in lattice riducendo l'efficacia anticoncezionale o la protezione contro le malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV. Si rivolga per favore al suo medico curante o al suo farmacista se necessita di altre informazioni.

Alcuni farmaci possono accentuare l'effetto di Scheriproct e aumentare il rischio di effetti indesiderati. Se assume uno di questi medicinali (tra cui alcuni prodotti anti-HIV come Ritonavir e Cobicistat) è possibile che il suo medico la sottoporrà ad attento monitoraggio.

Unguento rettale

Macrogolglicerolo ricinoleato

L'olio di ricino polietossilato (macrogolglicerolo ricinoleato) contenuto nell'unguento rettale Scheriproct può causare irritazioni cutanee.

Fragranza contenente allergeni

L'unguento rettale Scheriproct contiene una fragranza con gli allergeni idrossicitronellale, geraniolo, citronellolo, linalolo, benzile benzoato, citrale, muschio di quercia, aldeide cinnamica, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one, eugenolo, benzil salicilato, isoeugenolo. Questi allergeni possono causare reazioni allergiche.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)

Si può usare Scheriproct durante la gravidanza o l'allattamento?



Scheriproct può essere utilizzato in gravidanza o durante l'allattamento solo se è stato esplicitamente prescritto dal medico.

Informi il medico se è incinta o potrebbe esserlo oppure se sta allattando.

Come regola generale vale che preparati ad applicazione locale contenenti corticosteroidi non devono essere utilizzati nei primi tre mesi di gravidanza.

Le donne che allattano devono evitare che il medicamento entri in contatto con il seno.

Durante la gravidanza e l'allattamento bisogna astenersi soprattutto da applicazioni prolungate o su una vasta area cutanea.

Come usare Scheriproct?

Adulti

È bene applicare Scheriproct unguento o supposte dopo l'evacuazione delle feci. Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la zona anale.

Unguento rettale

Se non prescritto diversamente dal medico, in generale l'unguento deve essere applicato due volte al giorno. Il primo giorno è possibile effettuare anche 4 applicazioni per ottenere una più rapida scomparsa della sintomatologia.

Anche se i disturbi sono scomparsi, si deve continuare ad applicare l'unguento 1 volta al giorno per una settimana. La durata del trattamento non deve comunque superare le 4 settimane.

Uso esterno (senza applicatore):

Applicare delicatamente in prossimità della regione anale e a livello dello sfintere, spalmando con le dita, un quantitativo di unguento del volume di un pisello, contrastando con la punta del dito la resistenza dello sfintere anale per potervi applicare l'unguento.

Uso rettale (con applicatore):

Per l'applicazione rettale dell'unguento, avvitare sul tubetto l'applicatore annesso alla confezione e rimuovere il cappuccio protettivo. Introdurre delicatamente l'applicatore nell'ano. Premere leggermente il tubetto per applicare una piccola quantità di unguento nel retto. Quindi sfilare l'applicatore con cautela.

Pulire esternamente l'applicatore con un fazzoletto di carta dopo ogni utilizzo, rimuovere i residui di unguento rimasti nell'applicatore con un bastoncino di cotone e pulirlo nuovamente con un fazzoletto di carta. Lavare l'applicatore sotto l'acqua calda per un minuto e asciugarlo esternamente con un fazzoletto di carta. Non utilizzare l'applicatore se è danneggiato.

Nel caso di processi infiammatori gravi e quindi particolarmente dolorosi, può tuttavia essere consigliabile l'applicazione dell'unguento all'interno con l'aiuto delle dita. In caso di prolasso di noduli è bene applicare una buona quantità di unguento e, se possibile, effettuare con il dito un riposizionamento dei noduli all'interno usando una certa cautela.

Supposte

Se non prescritto diversamente dal medico: normalmente si deve introdurre in profondità 1 supposta al giorno. In caso di disturbi gravi, il primo giorno si può applicare 1 supposta per 2 o 3 volte.

Anche se i disturbi sono scomparsi, si deve continuare ad applicare 1 supposta ogni due giorni per una settimana. La durata del trattamento non deve comunque superare le 4 settimane.

Popolazione pediatrica

L'uso e la sicurezza di Scheriproct nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati. Pertanto, il medicamento non viene usato in questi gruppi di età.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Scheriproct?

Con l'applicazione di Scheriproct possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

A seguito dell'uso prolungato di Scheriproct (superiore a 4 settimane) possono manifestarsi alterazioni locali come l'assottigliamento della cute.

Possono manifestarsi reazioni cutanee di tipo allergico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare l'unguento rettale Scheriproct a temperatura non superiore a 25 °C, le supposte in frigorifero (2-8 °C).

Tenere fuori della portata dei bambini.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Scheriproct?

Principi attivi

Unguento rettale

1 g contiene: 1,9 mg di prednisolone esanoato e 5 mg di cloridrato di cincocaina.

Supposte

1 supposta contiene: 1,3 mg di prednisolone esanoato e 1 mg di cincocaina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Unguento rettale

Ottildodecanolo, olio di ricino raffinato, olio di ricino idrogenato, macrogol-400-ricinoleato, aromi (contiene idrossicitronellale, geraniolo, citronellolo, linalolo, benzile benzoato, citrale, muschio di quercia, aldeide cinnamica, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-but-en-2-one, eugenolo, benzil salicilato, isoeugenolo).

Supposte

Grasso solido

Numero dell'omologazione

24137, 24138 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Scheriproct? Quali confezioni sono disponibili?

Scheriproct si può avere in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Il medicamento è disponibile in tubetti da 10 g di unguento rettale (con applicatore riutilizzabile) e da 30 g di unguento rettale (con applicatore riutilizzabile) e in scatole da 12 supposte.

Titolare dell'omologazione

Medius AG, 4132 Muttenz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

