

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Ventolin 5 mg/mL soluzione concentrata per apparecchi aerosol

GlaxoSmithKline AG

Che cos'è Ventolin soluzione per apparecchi aerosol e quando si usa?

La soluzione Ventolin per apparecchi aerosol esplica un'azione spasmolitica sulla muscolatura bronchiale e si usa nel trattamento prolungato dell'asma, della bronchite cronica con o senza enfisema polmonare (dilatazione patologica degli alveoli polmonari), nonché nel trattamento di un attacco di asma molto violento.

Convogliato dall'inalazione, il principio attivo arriva direttamente nei polmoni e l'azione si manifesta rapidamente.

Ventolin soluzione per apparecchi aerosol deve essere usato solo su prescrizione medica.

Quando non si può usare Ventolin soluzione per apparecchi aerosol?

Ventolin soluzione per apparecchi aerosol non si può usare in caso di ipersensibilità verso uno dei componenti della formulazione né quando si assumono contemporaneamente determinati preparati cardiaci (cosiddetti betabloccanti non selettivi, quali ad es. il propranololo).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Ventolin soluzione per apparecchi aerosol?

Ventolin deve essere utilizzato al bisogno e non regolarmente.

L'effetto rilassante sulla muscolatura bronchiale dura solitamente 4 ore. Qualora l'effetto del dosaggio prescritto dovesse durare meno di 3 ore, non deve assolutamente aumentare la dose, ma informarne immediatamente il suo medico affinché possano essere adottate misure supplementari, se necessario.

L'uso di Ventolin più di due volte a settimana per il trattamento dei sintomi dell'asma, senza contare l'uso profilattico prima dello sport, è indice di un'asma mal controllata. Il rischio di gravi attacchi d'asma (peggioramento dell'asma) può essere aumentato e possono verificarsi complicanze gravi che possono essere pericolose per la vita o fatali. Si rivolga al suo medico il prima possibile per controllare il suo trattamento per l'asma.

Se per trattare l'infiammazione dei polmoni usa ogni giorno un medicamento, ad esempio un «corticosteroide inalatorio», è importante che continui ad usarlo regolarmente, anche se si sente meglio.

Importante per la terapia della dispnea che insorge all'improvviso o peggiora rapidamente:

rivolgersi senza indugio al medico o all'ospedale più vicino se la dispnea non migliora in modo evidente con ulteriori inalazioni.

Se si somministra Ventolin contemporaneamente ad altri medicinali, le loro azioni possono influenzarsi a vicenda. Bisogna tener conto di questa eventualità quando si usano p.es. medicinali diuretici e preparati per il trattamento di malattie della tiroide, del morbo di Parkinson (paralisi agitante), di determinate cardiopatie (insufficienza cardiaca, alterazioni del ritmo cardiaco), di malattie reumatiche e infiammatorie, nonché del diabete. Il medico sa quali misure precauzionali devono essere adottate se lei deve assumere uno o più dei suddetti medicinali insieme a Ventolin.

Dato che nei bambini l'assunzione accidentale di Ventolin soluzione per apparecchi aerosol può provocare gravi sintomi d'intossicazione, si deve assolutamente badare di custodire il preparato fuori della portata dei bambini.



Questo medicamento contiene 0,1 mg di benزالconio cloruro per mL. Il benزالconio cloruro può causare respiro ansimante e difficoltà respiratorie (bronicospasmi - restringimento crampiforme delle vie respiratorie).

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffra di altre malattie (ad es. ipertiroidismo, diabete [inclusi valori glicemici elevati], ipertensione arteriosa o altre malattie cardiocircolatorie),
- soffra di allergie o
- assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applichi esternamente.

Si può usare Ventolin soluzione per apparecchi aerosol durante la gravidanza o l'allattamento?

Se ha in corso o desidera una gravidanza, può usare Ventolin soluzione per apparecchi aerosol solo dopo avere consultato il medico. Lo stesso vale anche se allatta il suo bambino.

Come usare Ventolin soluzione per apparecchi aerosol?

Importante: la soluzione Ventolin per apparecchi aerosol deve essere usata solo con un apparecchio per inalazioni e non deve essere né iniettata né inghiottita.

La soluzione concentrata Ventolin deve essere diluita con un'apposita soluzione fisiologica di cloruro di sodio (allo 0,9%; sterile).

Il medico prescriverà un dosaggio adeguato alla gravità della malattia.

Se le è stato prescritto un medicamento antinfiammatorio contro l'asma per l'uso giornaliero (ad es. un corticosteroide inalatorio), è importante che continui a usarlo regolarmente, anche se ha meno disturbi o se non ha bisogno di Ventolin soluzione.

Salvo diversa prescrizione medica, valgono i seguenti criteri posologici.

Adulti e bambini sopra i 6 anni: inalare 3-4 volte al giorno 0,25 mL di soluzione Ventolin diluita in 2-3 mL di soluzione fisiologica sterile.

Bambini al di sotto dei 6 anni: inalare 2-3 volte al giorno 0,15 mL di soluzione di Ventolin diluita in 1 mL di soluzione fisiologica sterile. La pipetta di dosaggio inclusa dentro l'imballaggio non è adatta per il dosaggio di 0,15 mL e si consiglia di utilizzare un dosatore adatto (per esempio una siringa da 1 mL) che deve essere eliminato dopo ogni utilizzo. Chieda consiglio al suo medico o al suo farmacista.

In caso di attacco d'asma molto violento, con l'ausilio del respiratore inalare per 15 minuti 0,25-0,5 mL di soluzione di Ventolin diluita in 2-3 mL di soluzione fisiologica sterile. Ripetere ogni 4-6 ore.

Se l'asma è attiva (ad esempio, se ha sintomi o riacutizzazioni frequenti, come dispnea che rende difficile parlare, mangiare o dormire, oppure tosse, respiro sibilante, senso di costrizione toracica o ridotta capacità fisica), deve informare immediatamente il suo medico, che potrebbe prescrivere o aumentare la dose di un altro medicamento per controllare i sintomi dell'asma, come un corticosteroide per uso inalatorio.

Informi il suo medico il prima possibile, se il suo medicamento non sembra funzionare bene come al solito (ad es. se ha bisogno di dosi più elevate per alleviare i suoi problemi respiratori o se l'inalatore non le dà sollievo per almeno 3 ore), poiché è possibile che l'asma peggiori e lei abbia bisogno di un altro medicamento.

Il dosaggio di Ventolin è troppo alto se compaiono palpitazioni o tremore delle mani. Di solito questi effetti indesiderati scompaiono entro poche ore. L'inalazione di un forte sovradosaggio dovrebbe essere segnalata al medico.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Ventolin soluzione per apparecchi aerosol?

Con l'uso di Ventolin possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali.



Raramente possono verificarsi un leggero tremito (specie delle mani), cefalee, palpitazioni cardiache e irritazioni della mucosa orofaringea; in casi molto rari, crampi muscolari di natura passeggera. Di solito, questi effetti indesiderati scompaiono usando regolarmente il medicamento.

Informi il suo medico sulla comparsa di questi effetti collaterali, ma non interrompa anzitempo il trattamento.

Nei bambini possono presentarsi talvolta sintomi di irrequietezza.

In casi isolati, sono stati segnalati disturbi del ritmo cardiaco (extrasistole, accelerazione del polso), nervosismo, aumento dell'appetito, disturbi gastrointestinali (come nausea e vomito), malessere, vertigini, senso di costrizione toracica, stanchezza (ma anche insonnia), irritabilità, aumentata sudorazione e problemi di minzione.

In casi molto rari, possono verificarsi reazioni di ipersensibilità quali ad esempio eruzioni cutanee, gonfiori alle labbra o alle palpebre, dispnea acuta e problemi circolatori. In questi casi è opportuno informare subito il medico. Si dovrebbe informare il medico anche nel caso in cui si manifestino problemi oculari quali ad esempio visione offuscata, ipertensione intraoculare (glaucoma) o compaia un *improvviso* peggioramento dei disturbi respiratori poco dopo l'uso della soluzione Ventolin.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituire i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Termine di consumo dopo l'apertura

La soluzione concentrata si conserva inalterata per un mese dopo la prima apertura del flaconcino (gettare la soluzione restante). Le soluzioni diluite personalmente devono essere preparate ogni giorno, sul momento.

Tutti i residui rimanenti nell'apparecchio aerosol devono essere eliminati.

Istruzioni di conservazione

Conservare la soluzione Ventolin per apparecchi aerosol a temperatura ambiente (15-25°C), al riparo dalla luce e fuori della portata dei bambini (cfr. paragrafo «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Ventolin soluzione per apparecchi aerosol?»).

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Ventolin soluzione per apparecchi aerosol?

Principi attivi

Salbutamolo 5 mg/mL come salbutamolo solfato.

Sostanze ausiliarie

Benzalconio cloruro, acido solforico (per aggiustare il pH), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

37397 (Swissmedic)



Dove è ottenibile Ventolin soluzione per apparecchi aerosol? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Ventolin 5 mg/mL soluzione concentrata con pipetta di dosaggio: 20 mL.

Titolare dell'omologazione

GlaxoSmithKline AG, 6340 Baar

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

