

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon e quando si usano ?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon trovano principalmente impiego, su prescrizione del suo medico, in caso di insufficienza miocardica.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Finora non si conoscono limitazioni d'uso. Se è usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon?

Salvo diversa prescrizione medica, 15-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al dì, aumentare in caso di necessità a 30 gocce. Se non si riscontra miglioramento passare a 30 gocce 6 volte al dì. Ridurre a miglioramento ottenuto lentamente sia la frequenza delle somministrazioni, sia la quantità delle gocce fino a un dosaggio di mantenimento di 10-15 gocce 3 volte al giorno. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 38 % Vol.



Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon?

10 ml contengono: Adonis vernalis D4 1 ml, Convallaria majalis D4 1 ml, Crataegus D1 1 ml, Digitalis purpurea D4 1 ml, Helleborus niger D4 1 ml, Urginea maritima var. rubra (Scilla) D4 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 38 % Vol.

Numero dell'omologazione

45086

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R58 Vernadon? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia su ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 11/2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

