

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fenistil, Gel

Haleon Schweiz AG

Che cos'è Fenistil gel e quando si usa?

Fenistil gel si oppone all'azione dell'istamina, una delle sostanze liberate durante le reazioni allergiche. Applicato sulla pelle, il gel calma il prurito causato da queste reazioni. Fenistil gel presenta anche proprietà anestetiche a carattere locale.

Fenistil gel è indicato in caso d'affezioni cutanee associate a prurito, ad es. in caso di punture d'insetti, ustioni leggere di piccola superficie, eritema solare lieve poco esteso, dermatosi allergiche poco estese.

Fenistil è un gel idrico che consente alla sostanza attiva di penetrare bene nella pelle; in questo modo calma rapidamente (dopo qualche minuto) il prurito e le irritazioni cutanee. Il gel è inodore, incolore e non macchia la biancheria.

Quando non si può usare Fenistil gel?

Non usi Fenistil gel se soffre di un'allergia al dimetindene maleato o a una delle sostanze ausiliarie.

Il preparato non va usato in presenza di un'allergia nota alle punture di insetti (seguire le istruzioni del medico).

Particolarmente nei piccoli bambini e nei lattanti, il preparato non va applicato su piaghe aperte o infiammate, dermatosi essudati o zone mucose, né in prossimità degli occhi.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Fenistil gel?

Per bambini al di sotto dei 2 anni, il preparato deve essere utilizzato solo su prescrizione di un medico.

Evitare l'applicazione su ampie superfici cutanee, nonché l'applicazione su ferite aperte o su lesioni o danni cutanei (come le ustioni) estesi, particolarmente nei piccoli bambini e nei lattanti.

Occorre evitare un'esposizione prolungata al sole delle regioni trattate.

Consulti il medico in caso di prurito molto forte o di lesioni estese.

Consulti il vostro medico se i sintomi persistono per più di 7 giorni.

Informazioni sulle sostanze ausiliarie

Fenistil gel contiene *150 mg/g di glicole propilenico (E1520)*: glicole propilenico può causare irritazione della pelle.

Fenistil gel contiene *0.05 mg/g di benzalconio cloruro*: benzalconio cloruro può irritare la pelle. Se sta allattando non applichi questo medicamento sul seno perché il bambino potrebbe ingerirlo con il suo latte.

Applicato sulla pelle, Fenistil gel presenta effetti trascurabili o assenti sulla capacità di condurre un veicolo o di utilizzare attrezzi o macchine.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.



Si può usare Fenistil gel durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza e l'allattamento, usi Fenistil gel solo con prudenza e mai su superfici cutanee estese, escoriate o infiammate. Il gel non dev'essere applicato sui capezzoli durante il periodo dell'allattamento.

Come usare Fenistil gel?

Adulti e bambini a partire di 2 anni:

Applicare localmente da 2 a 4 volte al giorno uno strato fine di Fenistil gel sulle parti da trattare e massaggiare leggermente.

Non utilizzare per più di 7 giorni senza aver consultato il medico.

Nei bambini sotto i 2 anni Fenistil gel dev'essere utilizzato solamente su prescrizione di un medico.

Informi immediatamente il suo medico, nel caso in cui lei o il suo bambino ingerisca accidentalmente questo medicamento.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Fenistil gel?

Effetti collaterali non comuni (riguarda da 1 a 10 persone su 1000): secchezza o bruciore della pelle.

Effetti collaterali molto rari (riguarda meno di 1 persona su 10 000): reazioni allergiche cutanee, tra cui eruzione cutanea e prurito.

In questo caso interrompa il trattamento e consulti il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fenistil gel?

Principio attivo

1 g di gel contiene 1 mg di maleato di dimetindene.

Sostanze ausiliarie

Glicole propilenico (E1520), sodio edetato, sodio idrossido, carbomeri, benzalconio cloruro, acqua depurata.



Numero dell'omologazione

38762 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Fenistil gel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.

Imballi da 30 e 100 g.

Titolare dell'omologazione

Haleon Schweiz AG, Risch.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

