

## Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

### **metasinusit, Gocce orali**

Medicamento omeopatico

#### **Quando si usa metasinusit?**

Secondo la concezione omeopatici metasinusit può essere utilizzato per l'infiammazione acuta e cronica dei seni paranasali.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

#### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

In caso di febbre alta o di mancanza di miglioramenti entro una settimana, è necessario consultare un medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere metasinusit.

#### **Quando non si può assumere metasinusit e quando la sua somministrazione richiede prudenza?**

Non utilizzare metasinusit in caso di ipersensibilità al cromo o disfunzione renale.

Non somministrare ai neonati e ai bambini di età inferiore ai 2 anni. Ai bambini di età compresa tra 2 e 6 anni, il medicamento deve essere somministrato solo dopo aver consultato il medico.

Questo medicamento contiene 160 mg di alcool (etanolo) per 20 gocce equivalenti a 280 mg/ml (28% p/v). La quantità di alcool contenuta in queste 20 gocce equivale a meno di 4 ml di birra o 2 ml di vino. La ridotta quantità di alcol all'interno del medicamento non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

#### **Si può assumere metasinusit durante la gravidanza o l'allattamento?**

A causa del principio attivo Hydrargyrum sulfuratum rubrum, metasinusit non deve essere assunto durante la gravidanza o l'allattamento.

#### **Come usare metasinusit?**

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti devono assumere 5-10 gocce in un po' d'acqua ogni mezz'ora o un'ora, fino a un massimo di 12 volte al giorno; per i disturbi cronici, assumere 10-20 gocce in un po'



d'acqua 3 volte al giorno.

I bambini a partire dai 6 anni di età possono assumere al massimo metà della dose per adulti, sempre diluita in acqua. Nei bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, il medicamento deve essere assunto solo dopo aver consultato il medico e dosato secondo le sue raccomandazioni. Non somministrare ai neonati e ai bambini di età inferiore ai 2 anni. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico.

A causa del principio attivo Hydrargyrum sulfuratum rubrum, metasinusit non deve essere utilizzato per più di una settimana senza consiglio medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### **Quali effetti collaterali può avere metasinusit?**

In alcuni casi possono verificarsi reazioni cutanee; in tal caso, il prodotto deve essere interrotto. Dopo l'assunzione può verificarsi un aumento della salivazione; si deve quindi interrompere il rimedio.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con metasinusit e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

### **Di che altro occorre tener conto?**

#### *Termine di consumo dopo l'apertura*

Si conserva per 12 mesi dall'apertura.

#### *Indicazione di stoccaggio*

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

#### *Ulteriori indicazioni*

Il medico o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene metasinusit?**

1 g di liquido contiene:

#### *Principi attivi*

Hydrargyrum sulfuratum rubrum (HAB) D6 50 mg, Hydrastis canadensis (Ph.Eur.Hom.) D3 (Ph.Eur.Hom 1.1.8) 30 mg, Kalium bichromicum (HAB) D4 100 mg, Verbascum densiflorum (HAB) TM 20 mg.

#### *Sostanze ausiliarie*

Acqua purificata ed etanolo.

Contiene il 33% di alcol in volume.

1 g corrisponde a 36 gocce.



**Numero dell'omologazione**

53671 (Swissmedic)

**Dove è ottenibile metasinusit? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone contagocce da 50 ml e 100 ml.

**Titolare dell'omologazione**

metapharmaka GmbH, 6462 Seedorf

Indirizzo postale: metapharmaka GmbH, Oberer Baumgarten 9, 6466 Bauen

**Fabbricante**

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell' ottobre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

