

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que PERSKINDOL Dolo et quand est-il utilisé?

PERSKINDOL Dolo est un médicament topique réservé à l'usage externe. Il contient des composants apaisants et anti-inflammatoires d'origine végétale dont les principes actifs pénètrent rapidement dans la peau et agissent directement sur les articulations et les tissus sous-jacents. En raison de ces propriétés, l'emploi de PERSKINDOL Dolo est indiqué dans le traitement principal ou adjuvant des troubles suivants:

- Affections rhumatismales d'origine inflammatoire des articulations et de la colonne vertébrale (arthrite).
- Affections rhumatismales dégénératives des articulations (arthrose).
- Douleurs et inflammations des articulations, des muscles, des tendons, des gaines tendineuses et des ligaments.
- Douleurs dans la colonne vertébrale ou dans le dos, lumbago et raideur cervicale.
- Contusions dues au sport ou à un accident telles que les meurtrissures, les entorses, les foulures, les claquages et les contractures musculaires.

Peu après l'application, PERSKINDOL Dolo procure une sensation agréable de réchauffement sur les parties du corps traitées.

Quand PERSKINDOL Dolo ne doit-il pas être utilisé?

Ne pas appliquer sur les muqueuses et les plaies vives! Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à des substances diminuant la douleur et l'inflammation (en particulier des composés/les substances similaires à l'acide salicylique, Salicin).

Ne pas utiliser PERSKINDOL Dolo en cas d'hypersensibilité à l'un des composants (voir composition).

Ne pas utiliser PERSKINDOL Dolo chez les enfants de moins de 4 ans et chez les patients atteints d'asthme bronchique.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/utilisation de PERSKINDOL Dolo, Gel?

Les patients souffrant d'une insuffisance rénale devraient éviter l'emploi du produit sur de grandes surfaces de peau ou durant un laps de temps prolongé.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, êtes allergique ou prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

PERSKINDOL Dolo peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

PERSKINDOL Dolo ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement sauf sur stricte prescription médicale pendant une brève période et sur une zone d'application réduite.

Comment utiliser PERSKINDOL Dolo?

Adultes:

Sauf prescription contraire, appliquez le produit, en fonction des besoins jusqu'à cinq fois par jour, en une fine couche sur les parties douloureuses du corps en massant brièvement sans presser.

Il est recommandé de se laver soigneusement les mains après application. Ne pas utiliser avec un bandage ou une compresse et ne pas couvrir la zone traitée.

Ne pas utiliser deux préparations à usage externe différentes en même temps et au même endroit.



L'utilisation et la sécurité d'emploi de PERSKINDOL Dolo n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Veillez vous conformer au dosage figurant dans le prospectus ou prescrit par votre médecin. Si vous avez l'impression que l'efficacité de PERSKINDOL Dolo est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires PERSKINDOL Dolo peut-il provoquer?

L'utilisation de PERSKINDOL Dolo peut provoquer les effets secondaires suivants:

Occasionnellement de légères démangeaisons cutanées, des rougeurs ou des sensations de brûlure.

En cas de rares réactions eczémateuses, ou de très rares réactions prononcées d'hypersensibilité, le traitement doit être interrompu et un médecin éventuellement consulté.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires non décrits ici, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Conserver à température ambiante (15–25 °C) et hors de portée des enfants.

Lors de l'application, éviter le contour des yeux.

PERSKINDOL Dolo ne doit pas être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention «EXP».

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient PERSKINDOL Dolo?

1 g de gel contient 129 mg d'huile de gaultheria (salicylate de méthyle), 95 mg d'huile d'aiguille de pin, des substances aromatiques (huile d'encens) et d'autres excipients.

Numéro d'autorisation

55548 (Swissmedic).

Où obtenez-vous PERSKINDOL Dolo? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tube de 50 ml, 100 ml et de 200 ml.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2011 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

