

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

AKUTUR, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa AKUTUR?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della Spagirica AKUTUR può essere usato in caso d'irritazione della vescica e dell'uretra con dolori durante la minzione.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

È importante bere molto durante il trattamento per garantire un sufficiente risciacquo delle vie urinarie. Se i sintomi si ripresentano o durano per diversi giorni e se compare la febbre, consultare un medico. Le infezioni gravi del tratto urinario possono avere conseguenze gravi se non trattate. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere AKUTUR.

Quando non si può assumere AKUTUR e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

AKUTUR non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità nota al veleno d'api (*Apis mellifica* D4) o ad altri ingredienti (*Echinacea*). AKUTUR non deve essere usato in caso di malattie sistemiche come tubercolosi, malattie delle leucociti (leucemia), collagenosi (processi autoimmuni generali con modificazione di tessuto connettivo come *Lupus erythematosus*) e sclerosi multipla.

Nei bambini di età inferiore a 12 anni AKUTUR può essere utilizzato solo dopo l'autorizzazione medica.

Questo medicinale contiene 91 mg di alcol (etanolo) per dose (20 gocce) equivalenti a 168 mg/ml (16,8% p/v) di etanolo. La quantità in 20 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 3 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere AKUTUR durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza



dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare AKUTUR?

Salvo diversa prescrizione medica:

adulti: 20 gocce, adolescenti dai 12 anni in su 10 – 15 gocce, da prendere 3 – 4 volte al giorno con un po' d'acqua prima dei pasti.

Nei bambini di età inferiore a 12 anni AKUTUR può essere utilizzato solo dopo l'autorizzazione medica.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere AKUTUR?

In seguito all'assunzione di AKUTUR possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: In rari casi, reazioni di ipersensibilità (come eruzioni cutanee e molto raramente - mancanza di respiro, reazioni circolatorie) a uno degli ingredienti (apis, echinacea). In questi casi è necessario interrompere la preparazione e consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con AKUTUR e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene AKUTUR?

1 g di liquido (= 1,02 ml / 38 gocce) contiene:

Principi attivi

Acidum benzoicum e resina (HAB) D4 (HAB 5a) 140 mg

Apis mellifica (HAB) D4 140 mg

Argentum nitricum (HAB) D4 140 mg

Berberis vulgaris e cortice (HAB) spag. Peka D2 (HAB 47b) 140 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida ex planta tota cum floribus (HAB) spag. Peka TM (HAB 47a) 150 mg

Lytta vesicatoria (HAB) D4 140 mg



Solidago virgaurea ex inflorescentibus (HAB) spag. Peka TM (HAB 47a) 150 mg

Sostanze ausiliarie

ethanol, acqua purificata.

Contiene 21 % vol. di alcol (ethanol)

Numero dell'omologazione

50847 (Swissmedic)

Dove è ottenibile AKUTUR? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 50 ml di liquido.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

