

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Pefrakehl D3, Pommade

Médicament homéopathique

Quand Pefrakehl D3, pommade est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Pefrakehl D3, pommade peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas d'affections mycotiques de la peau et des muqueuses.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Pefrakehl D3, pommade peut être utilisé simultanément.

Quand Pefrakehl D3, pommade ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

. Ne pas utiliser pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication).

Pefrakehl D3, pommade peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Pefrakehl D3, pommade?

Sauf prescription contraire du médecin, chez des adultes : appliquer une mince couche 1 – 3 fois par jour sur la peau concernée. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. L'utilisation et la sécurité de Pefrakehl D3, pommade n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Pefrakehl D3, pommade peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez d'effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette



aggravation persiste, cessez le traitement avec Pefrakehl D3, pommade et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au » sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Pefrakehl D3, pommade?

1 g de pommade contient:

100 mg Candida parapsilosis D3 aquos. dilutio selon prescription 5a HAB.

Cette préparation contient en outre des excipients: Alcools de graisse de laine, vaseline blanche, alcool cétostéarylique, propylèneglycol, triglycerida saturata media, monostéarate de glycérol 40-55, sulfate de magnésium, acide lactique et eau.

Numéro d'autorisation

50296 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Pefrakehl D3, pommade? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 30 g.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2002 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

