

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gyno-Pevaryl® Crème vaginale et Ovules vaginaux

Medius AG

Qu'est-ce que Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux et quand doit-il être utilisé?

Gyno-Pevaryl est une préparation qui détruit les champignons responsables chez l'homme d'infections au niveau des organes génitaux.

Sur prescription médicale, Gyno-Pevaryl est destiné au traitement d'affections dues aux champignons au niveau du vagin et des organes génitaux externes.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

La mycose vaginale (infection due à des champignons) ne peut être traitée correctement que si vous vous conformez exactement aux instructions de votre médecin.

Les infections, notamment aussi celles du vagin, sont des maladies transmissibles. Veuillez respecter des mesures d'hygiène strictes, telles que des lavages réguliers, pendant toute la durée du traitement.

Les sous-vêtements, les serviettes de toilette et les gants de toilette doivent être changés tous les jours.

Ne perdez pas de vue que ce médicament vous a été prescrit par le médecin pour le traitement de votre maladie actuelle. Il ne doit pas être utilisé pour le traitement d'autres affections.

Quand Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux ne doit-il pas être utilisé?

Gyno-Pevaryl est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité au principe actif, à d'autres antifongiques comparables (dérivés de l'imidazole) ou à l'un des excipients.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux?

Le champignon présent dans le vagin provoque en général des troubles tels que des démangeaisons, une sensation de brûlure et des pertes vaginales. Dans de rares cas, ces manifestations peuvent s'amplifier passagèrement pendant l'utilisation de Gyno-Pevaryl. La persistance de ces irritations peut être un signe de réactions d'hypersensibilité et impose une consultation médicale. La survenue de symptômes prononcés peut être un signe d'infection due à des champignons ou bactéries non sensibles. Vous devez consulter un médecin dans ces deux cas.

Pour éviter toute rechute, il convient de traiter aussi les lèvres de la vulve et le partenaire.

Gyno-Pevaryl ne doit pas être utilisé au niveau de l'œil ou d'autres parties du corps et ne doit pas être ingéré.

Il convient d'éviter l'utilisation simultanée de Gyno-Pevaryl et d'un diaphragme ou de préservatifs à titre contraceptif: celle-ci pourrait d'une part altérer la surface du diaphragme et diminuer la résistance à la déchirure du préservatif et, d'autre part, réduire l'efficacité de Gyno-Pevaryl.

Si vous avez recours à une contraception par un spermicide, parlez-en avec votre médecin, car un traitement simultané par Gyno-Pevaryl pourrait rendre votre contraception inefficace. D'autres médicaments à usage externe ne doivent pas être utilisés en même temps que Gyno-Pevaryl.

Informez votre médecin, si vous prenez en même temps des fluidifiants du sang (anticoagulants) comme l'acénocoumarol (Sintrom®) ou la phenprocoumone (Marcoumar®), parce que Gyno-Pevaryl peut influencer



leur effet.

Des patientes présentant une réaction d'hypersensibilité à d'autres médicaments antimycosiques ont également rapporté une hypersensibilité au nitrate d'éconazole. Veuillez informer votre médecin si vous avez déjà présenté une réaction d'hypersensibilité à un médicament antimycosique.

Excipients

Gyno-Pevaryl Crème vaginale contient 10 mg d'acide benzoïque par 5 g de crème, équivalent à 2,0 mg/1 g.

Gyno-Pevaryl Crème vaginale contient du butylhydroxanisole (E 320) qui peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous utilisez déjà d'autres médicaments (même en automédication!) par voie orale ou vaginale.

Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Pendant la grossesse et la période d'allaitement, Gyno-Pevaryl ne doit être utilisé que sur prescription médicale. Il est recommandé de ne pas allaiter pendant l'utilisation de Gyno-Pevaryl.

Comment utiliser Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux?

Gyno-Pevaryl Crème vaginale

La crème vaginale est destinée à l'application au niveau de la vulve et au traitement du partenaire. Poursuivre le traitement jusqu'à ce que le tube soit vide.

Utilisation chez la femme: une fois par jour, laver à l'eau chaude la zone traitée et y appliquer la crème en fine couche.

Traitement du partenaire: pendant 1 à 2 semaines, laver 1 fois par jour le gland et le prépuce à l'eau chaude avant d'appliquer la crème en fine couche.

Gyno-Pevaryl Ovules vaginaux

Les ovules Gyno-Pevaryl sont destinés à être utilisés dans le vagin.

Sauf prescription contraire du médecin, pendant 3 jours consécutifs, le soir au coucher, de préférence en position couchée, introduire profondément dans le vagin un ovule. Il faut veiller à bien introduire l'ovule jusqu'au fond du vagin.

Une fois commencé, le traitement antifongique doit être poursuivi pendant toute la durée prescrite par le médecin. Les symptômes de la maladie disparaissent souvent avant la guérison complète de l'infection. Il faut donc continuer le traitement après la disparition des manifestations de la maladie. Une durée d'utilisation insuffisante ou un arrêt anticipé du traitement peut entraîner une récurrence de la maladie.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Enfants et adolescents

La sécurité et l'efficacité de Gyno-Pevaryl n'ont pas été testées chez les enfants.

Quels effets secondaires Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux peut-il provoquer?

La prise de Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux peut provoquer les effets secondaires suivants:

Très fréquent: sensation de brûlure de la peau ou démangeaisons au niveau du site d'application.

Occasionnel: éruption cutanée.



Très rare: réactions allergiques avec gonflement de la peau et des muqueuses, urticaire, dermatite de contact et peau qui pèle.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, qui ne sont pas décrits dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas conserver au-dessus de 25 °C. Conserver dans l'emballage d'origine.

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux?

Principes actifs

1 ovule vaginal contient 150 mg de nitrate d'éconazole.

1 g de crème vaginale contient 10 mg de nitrate d'éconazole.

Excipients

Ovule vaginal: graisse hydrogénée.

Crème vaginale: acide benzoïque (E 210), butylhydroxyanisole (E 320), paraffine épaisse, stéarate d'éthylène glycol, macrogol-32-stéarate, macrogol-6-stéarate, macrogolglycérides oléiques, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

70578 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sur ordonnance médicale.

Gyno-Pevaryl Crème vaginale et Ovules vaginaux (15 g de crème vaginale et 3 Ovules vaginaux).

Titulaire de l'autorisation

Medius AG, 4132 Muttenz.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

