

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il massimo beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

neo-angin/- junior/- forte/- forte orange

Doetsch Grether AG

Che cos'è neo-angin e quando si usa?

Le pastiglie neo-angin contengono un'associazione dei principi attivi cetilpiridinio e lidocaina.

Mentre il cetilpiridinio è responsabile dell'effetto antisettico delle pastiglie, la lidocaina allevia i dolori della mucosa del cavo orale, della faringe e della laringe.

neo-angin è utilizzato per favorire la guarigione nelle infiammazioni del cavo orale e/o della faringe e della laringe, come pure per il trattamento sintomatico dei dolori nella deglutizione e in caso di raucedine.

neo-angin può essere assunto dietro prescrizione medica anche dopo interventi dentistici o chirurgici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Indicazione per i diabetici:

Questi medicinali contengono 2,5 g di carboidrati digeribili per pastiglia e sono med-translationstti ai diabetici.

Quando non si può usare neo-angin?

In caso di pazienti con ipersensibilità nota verso uno dei componenti o verso altri anestetici locali.

In caso di pazienti ipersensibili alle sostanze coloranti azoiche, agli acidi acetilsalicilici nonché ad antireumatici e analgesici (inibitori di prostaglandina).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di neo-angin?

In caso di ferite sanguinanti nella mucosa, le pastiglie devono essere assunte con prudenza e solo se necessario, poiché l'assimilazione del principio attivo nel sangue può essere aumentata. Ciò vale in particolare nel caso di pazienti con disturbi cardiocircolatori o tendenza ad avere crampi.

In caso di ridotta funzionalità epatica e/o renale, poiché queste riduzioni possono portare a una maggiore concentrazione del principio attivo nel sangue.

neo-angin forte non è consigliato per bambini sotto i 12 anni.

neo-angin e neo-angin Junior non è consigliato per bambini sotto i 6 anni

In caso di febbre alta o se non si verifica alcun miglioramento entro 3 giorni bisogna rivolgersi al medico.

Sostanze ausiliarie

Neo-angin junior, neo-angin forte orange e neo-angin pastiglie contengono coloranti azoici, che possono causare delle reazioni allergiche (cfr. anche «Quando non si può usare neo-angin?»).

Neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte e neo-angin forte orange pastiglie contengono isomalto. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte e neo-angin forte orange pastiglie. Il valore calorico è di 2,3 kcal/g di isomalto. Neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte e neo-angin forte orange pastiglie possono avere un lieve effetto lassativo, se vengono assunti più volte al giorno.

Neo-angin junior, neo-angin e neo-angin forte orange pastiglie contengono alcol (etanolo). La piccola quantità di alcol in questi medicinali non produrrà effetti rilevanti. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.



Neo-angin junior e neo-angin forte orange pastiglie contengono un aroma a sua volta contenente gli allergeni citrale, linalolo, D-limonene, benzile benzoato, benzile cinnamato e geraniolo. Neo-angin pastiglie contiene un aroma a sua volta contenente gli allergeni citrale, D-limonene, linalolo, alcol di cannella, citronellolo e geraniolo. Neo-angin forte pastiglie contiene un aroma a sua volta contenente gli allergeni citrale, D-limonene e linalolo. Queste sostanze possono causare reazioni allergiche.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può somministrare neo-angin durante la gravidanza o l'allattamento?

Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare neo-angin?

neo-angin junior:

Bambini dai 6 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 1-2 ore

neo-angin:

Adulti e bambini dai 6 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 1-2 ore

neo-angin forte / forte orange:

Adulti e ragazzi dai 12 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 1-3 ore. Non superare la dose giornaliera di 12 pastiglie.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere neo-angin?

In seguito all'assunzione di neo-angin possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

neo-angin se usato in dosi elevate e per lungo tempo, può portare a delle irritazioni locali. In caso di ferite fresche in bocca, sussiste il pericolo di emorragie.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Si può arrivare a una modificazione della percezione del gusto o a una sensazione di intorpidimento della lingua.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità o sensibilizzazioni nell'area della bocca. Di regola questi effetti regrediscono in breve tempo.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori della portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene neo-angin?

1 pastiglia contiene:



Principi attivi

neo-angin junior: 1,0 mg di cetilpiridinio cloruro; 1,0 mg di lidocaina cloridrato monoidrato.

neo-angin: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 1,23 mg di lidocaina cloridrato monoidrato.

neo-angin forte: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 2,47 mg di lidocaina cloridrato monoidrato.

neo-angin forte orange: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 2,47 mg di lidocaina cloridrato monoidrato.

Sostanze ausiliarie

neo-angin junior: isomalto (E 953), acido ascorbico, acido tartarico, aroma di arancia (contiene citrale, linalolo, D-limonene), aroma di albicocca (contiene citrale, linalolo, benzile benzoato, benzile cinnamato, geraniolo, D-limonene, etanolo), giallo arancione S (E 110, colorante azoico).

neo-angin: isomalto (E 953), acido ascorbico, acido tartarico, limone essenza (contiene citrale, D-limonene, linalolo), aroma di miele (contiene etanolo, glicole propilenico (E 1520), alcol di cannella, citronellolo, geraniolo, D-limonene, linalolo), giallo di chinolina (E 104), Ponceau 4R (E 124, colorante azoico), blu patentato V (E 131).

neo-angin forte: isomalto (E 953), acido ascorbico, acido tartarico, levomentolo, limone essenza (contiene citrale, D-limonene, linalolo).

neo-angin forte orange: isomalto (E 953), acido ascorbico, acido tartarico, aroma di arancia (contiene citrale, linalolo, D-limonene), aroma di albicocca (contiene citrale, linalolo, benzile benzoato, benzile cinnamato, geraniolo, D-limonene, etanolo), giallo arancione S (E 110, colorante azoico).

Numero dell'omologazione

57618 (Swissmedic)

57625 (Swissmedic)

57622 (Swissmedic)

62654 (Swissmedic)

Dove è ottenibile neo-angin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Confezioni

neo-angin junior: 24 pastiglie

neo-angin: 24 pastiglie

neo-angin forte: 24 pastiglie

neo-angin forte orange: 24 pastiglie

Titolare dell'omologazione

Doetsch Grether SA, Basilea

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

