

## Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

### **SEPTONSIL, Globuli**

*Homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel*

#### **Wann wird SEPTONSIL angewendet?**

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild und dem Therapieprinzip der Spagyrik kann SEPTONSIL bei Halsentzündungen angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung und dem Therapiekonzept der Spagyrik.

#### **Was sollte dazu beachtet werden?**

Bei höherem Fieber oder wenn innerhalb einer Woche keine Besserung auftritt, ist ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Bei Erkältungsanfälligkeit von Kindern empfiehlt es sich, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SEPTONSIL gleichzeitig eingenommen werden darf.

#### **Wann darf SEPTONSIL nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?**

SEPTONSIL darf nicht angewendet werden bei bekannter Allergie gegen Korbblütler, z.B. Kamille, Arnika, Echinacea etc. SEPTONSIL darf nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Erkrankung der weissen Blutzellen (Leukämie), Kollagenosen (generalisierte Autoimmunprozesse mit Bindegewebsveränderungen wie bei Lupus erythematoses) und Multiple Sklerose. SEPTONSIL darf bei Säuglingen nicht angewendet werden. Bei Kleinkindern unter 2 Jahren nur nach ärztlicher Verordnung anwenden. Bitte nehmen Sie SEPTONSIL erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

#### **Darf SEPTONSIL während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?**

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

#### **Wie verwenden Sie SEPTONSIL?**



Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 4 - 5 mal täglich 10 Globuli, Kinder unter 12 Jahren 3 - 4 mal täglich 8 Globuli. Globuli langsam im Mund zergehen lassen.

SEPTONSIL darf bei Säuglingen nicht angewendet werden. Bei Kleinkindern unter 2 Jahren nur nach ärztlicher Verordnung anwenden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

### **Welche Nebenwirkungen kann SEPTONSIL haben?**

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten (Echinacea TM). Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SEPTONSIL ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

### **Was ist ferner zu beachten?**

#### *Haltbarkeit*

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "verwendbar bis" bezeichneten Datum verwendet werden.

#### *Lagerungshinweis*

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.  
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### *Weitere Hinweise*

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

### **Was ist in SEPTONSIL enthalten?**

In 1 g Globuli (70 - 90 Globuli) sind verarbeitet:

#### *Wirkstoffe*

Aconitum napellus ex planta tota florentibus spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,2 mg

Ailanthus altissima (HAB) D4 1,2 mg

Argentum nitricum (HAB) D4 1,2 mg

Atropa belladonna ex planta tota sine stipite spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,2 mg

Barium carbonicum (HAB) D8 1,2 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida

ex planta tota cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 1,6 mg



Lachesis (HAB) D8 (HAB SV, 5a) 1,2 mg

Phytolacca americana (HAB) D4 1,2 mg

#### *Hilfsstoffe*

1 g Saccharose

#### **Zulassungsnummer**

55993 (Swissmedic)

#### **Wo erhalten Sie SEPTONSIL? Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung zu 10 g.

#### **ZulassungsinhaberIn**

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

#### **HerstellerIn**

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, DE-88353 Kisslegg

**Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2024 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.**

