

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SEPTONSIL, globules

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand SEPTONSIL est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, SEPTONSIL peut être utilisé en cas d'inflammation de la gorge.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas de fièvre plus élevée ou s'il n'y a pas d'amélioration pendant une semaine, il faut consulter un médecin. En cas de tendances aux refroidissements chez les enfants, il convient de consulter un médecin. Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SEPTONSIL peut être pris simultanément.

Quand SEPTONSIL ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

SEPTONSIL ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue aux composées, p.ex. lors d'allergie à la camomille, à l'arnica, à l'échinacée, etc. SEPTONSIL ne doit pas être utilisé en cas de maladies systémiques évolutives telles que la tuberculose, les maladies liées aux globules blancs (leucémie), les collagénoses (processus auto-immuns généralisés avec modifications du tissu conjonctif comme dans le lupus érythémateux) et la sclérose en plaques. SEPTONSIL ne doit pas être utilisé chez les nourrissons. Chez les enfants en bas âge de moins de 2 ans, ne l'utiliser que sur prescription médicale.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

SEPTONSIL peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer, si possible, à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.



Comment utiliser SEPTONSIL ?

Sauf prescription contraire du médecin, adultes et adolescents à partir de 12 ans, 10 globules 4 - 5 fois par jour, enfants de moins de 12 ans, 8 globules 3 - 4 fois par jour. Laisser fondre lentement les globules dans la bouche.

SEPTONSIL ne doit pas être utilisé chez les nourrissons. Chez les enfants en bas âge de moins de 2 ans, ne l'utiliser que sur prescription médicale.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires SEPTONSIL peut-il provoquer ?

Dans des cas rares, des réactions d'hypersensibilité (Echinacea TM) ont été observées.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SEPTONSIL et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SEPTONSIL ?

1 g de globules (70 à 90 globules) contient:

Principes actifs

Aconitum napellus ex planta tota florentibus spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,2 mg

Ailanthus altissima (HAB) D4 1,2 mg

Argentum nitricum (HAB) D4 1,2 mg

Atropa belladonna ex planta tota sine stipite spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,2 mg

Barium carbonicum (HAB) D8 1,2 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea



pallida ex planta tota cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 1,6 mg

Lachesis (HAB) D8 (HAB SV, 5a) 1,2 mg

Phytolacca americana (HAB) D4 1,2 mg

Excipients

Saccharose 1 g

Numéro d'autorisation

55993 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SEPTONSIL? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 10 g.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, DE-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

