

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SEPTONSIL, globuli

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa SEPTONSIL?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, SEPTONSIL può essere usato in caso di infiammazioni della gola.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Consultare un medico in caso di febbre elevata o se un miglioramento non si manifesta durante una settimana. In caso di una predisposizione per raffreddori nei bambini, si consiglia di consultare un medico. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SEPTONSIL.

Quando non si può assumere SEPTONSIL e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

SEPTONSIL non deve essere utilizzato in caso di allergia nota alle piante composite, ad esempio camomilla, arnica, echinacea, ecc. SEPTONSIL non deve essere usato in caso di malattie sistemiche progressive come la tubercolosi, le malattie dei globuli bianchi (leucemia), le collagenosi (processi autoimmuni generalizzati con alterazioni del tessuto connettivo come nel lupus eritematoso) e la sclerosi multipla. SEPTONSIL non deve essere usato nei neonati. Per i neonati di età inferiore ai 2 anni, utilizzare solo su prescrizione medica.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questomedicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere SEPTONSIL durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SEPTONSIL?



Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti e gli adolescenti a partire dai 12 anni dovrebbero assumere 10 globuli 4 - 5 volte al giorno, i bambini sotto i 12 anni 8 globuli 3 - 4 volte al giorno. Lasciare che i globuli si sciolgano lentamente in bocca.

SEPTONSIL non deve essere usato nei neonati. Per i neonati di età inferiore ai 2 anni, usare solo secondo la prescrizione medica.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SEPTONSIL?

In casi rari sono stati osservati reazioni di ipersensibilità (Echinacea TM). Se osserva effetti collaterali non menzionati, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SEPTONSIL e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SEPTONSIL?

In 1 g di globuli (70 - 90 globuli) vengono elaborati:

Principi attivi

Aconitum napellus ex planta tota florentibus spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,2 mg

Ailanthus altissima (HAB) D4 1,2 mg

Argentum nitricum (HAB) D4 1,2 mg

Atropa belladonna ex planta tota sine stipite spag. Peka D4 (HAB 47a) 1,2 mg

Barium carbonicum (HAB) D8 1,2 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida

ex planta tota cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 1,6 mg



Lachesis (HAB) D8 (HAB SV, 5a) 1,2 mg

Phytolacca americana (HAB) D4 1,2 mg

Saccarosio 1 g

Numero dell'omologazione

55993 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SEPTONSIL? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 10 g.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, DE-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

