

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Panax Ginseng Pine Brand Extrakt, Lösung zum Einnehmen

Pflanzliches Arzneimittel

Was ist Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen und wann wird es angewendet?

Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen enthält einen ethanolischen Extrakt aus der roten Panax Ginseng C.A. Meyer-Wurzel, einem Naturprodukt aus dem Gebirge von Nordost-China. Schon seit über 2000 Jahren wird dort die Ginsengwurzel angewendet.

Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen wird angewendet zur geistigen und körperlichen Leistungssteigerung, bei Konzentrationsschwäche, zur Rekonvaleszenz sowie bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen.

Was sollte dazu beachtet werden?

Unausgewogene Ernährung, übermässiger Salz- und Fettkonsum, sowie Rauchen können Ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und sollten deshalb vermieden werden.

Bevor die Behandlung mit Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen begonnen wird, sollte geklärt werden, ob die Krankheitssymptome nicht auf einer spezifisch zu behandelnden Grunderkrankung beruhen. Dafür sollten Sie eine Fachperson um Rat fragen. Wenn die Beschwerden nicht innerhalb einer angemessenen Zeit nachlassen, sollte eine Abklärung durch Ihren Arzt oder Ihre Ärztin erfolgen.

Ginseng kann möglicherweise den Blutzucker-Spiegel senken. Diabetes-Patientinnen und Diabetes-Patienten sollen daher Ginseng-haltige Arzneimittel nur nach Rücksprache mit einem Arzt bzw. einer Ärztin einnehmen.

Wann darf Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen soll nicht eingenommen werden bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe (siehe «Was ist in Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen enthalten?»).

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine Untersuchungen vor. Es soll bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Eine Wechselwirkung mit Arzneimitteln, die die Blutgerinnung hemmen (Abschwächung sog. oraler Antikoagulantien z.B. Phenprocoumon, Acenocoumarol, Warfarin) kann nicht ausgeschlossen werden.

Dieses Arzneimittel enthält 14 Vol.% Alkohol. Bei Beachtung der empfohlenen Dosierung werden bei jeder Einnahme ca. 1,7 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht unter anderem für Leberkranke, Alkoholiker,



Epileptiker, Hirngeschädigte, Schwangere und Stillende. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann verstärkt oder beeinträchtigt werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Alkohol kann zu Schädigungen des ungeborenen Kindes führen. Wenn Sie schwanger sind, es werden möchten, oder wenn Sie stillen, sollten Sie vorsichtshalber aufgrund des Alkoholgehalts auf die Einnahme von Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen?

Erwachsene: Von Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen wird täglich vor dem Mittag- und Abendessen je 15 ml eingenommen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt, bzw. von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Die Behandlungsdauer kann sich im Allgemeinen über 1-2 Monate erstrecken. Vor einer längeren Anwendung ist aber vorsichtshalber der Arzt bzw. die Ärztin zu befragen.

Die Anwendung und Sicherheit von Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist bisher nicht geprüft worden, es soll deshalb bei Kindern und Jugendlichen nicht angewendet werden.

Welche Nebenwirkungen kann Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen haben?

In seltenen Fällen kann die Einnahme von hohen Dosen von Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen zu Magenbeschwerden führen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Eine eventuelle Trübung oder Satzbildung ist bei diesem Produkt normal. Vor Gebrauch gut schütteln! Das Arzneimittel bei Raumtemperatur (15-25°C) und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit EXP bezeichneten Datum verwendet werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Das Präparat ist auch alkoholfrei erhältlich (Kapseln).

Was ist in Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen enthalten?

15 ml Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen enthalten: 0,83 ml Flüssigextrakt aus der roten Wurzel von Panax Ginseng C.A. Meyer (DEV:1-1,2:1), Auszugsmittel: Alkohol 60%; Süsswein. Enthält 14 Vol.% Alkohol.

Zulassungsnummer



42072 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Panax Ginseng Pine Brand Extrakt Lösung zum Einnehmen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Flaschen zu 300 ml.

ZulassungsinhaberIn

PANAX-Import, F. Ruckstuhl + Co., 9500 Wil SG

Diese Packungsbeilage wurde im April 2006 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

