

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Panax Ginseng Pine Brand Estratto, soluzione orale

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto e quando si usa?

La soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto contengo un estratto etanolic della radice rossa di Panax Ginseng C.A. Meyer, un prodotto naturale proveniente dalle montagne della Cina nord-orientale. In questa regione, la radice del ginseng è utilizzata già da più di 2000 anni.

La soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto viene impiegato per incrementare il rendimento mentale e fisico, in caso di difficoltà di concentrazione, durante un periodo di convalescenza, in casi di esaurimento e di debolezza generale.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Un'alimentazione non equilibrata, il consumo eccessivo di sale e grassi e il fumo possono causare una riduzione delle prestazioni fisiche e mentali e andrebbero quindi evitati.

Prima di iniziare il trattamento con la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto, è necessario appurare che i sintomi della malattia non siano riconducibili ad una patologia di base che deve essere trattata in modo specifico. Per questo, dovrà ricorrere al consiglio di uno specialista. Qualora i disturbi non diminuissero entro un periodo di tempo adeguato, dovrà rivolgersi al suo medico.

Il ginseng potrebbe abbassare i livelli di zucchero nel sangue. I pazienti diabetici dovrebbero pertanto assumere medicinali contenenti ginseng solo dopo aver consultato il proprio medico.

Quando non si può assumere la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

La soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto non dovrebbe essere assunto in caso di ipersensibilità nota ad uno dei suoi componenti (vedi «Cosa contiene la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto?»).

Non esistono esami sulla somministrazione di questo farmaco ai bambini e adolescenti. Di conseguenza, non deve essere somministrato a bambini e adolescenti sotto i 18 anni.

Non si può escludere un'interazione con farmaci che inibiscono la coagulazione del sangue (indebolimento dei cosiddetti anticoagulanti orali ad es. fenprocumone, acenocumarolo, warfarin).

Questo medicamento contiene 14% vol. d'alcol. In base alla posologia raccomandata con ogni dose, sono assunti fino a 1,7 g di alcol. Sussiste un rischio per la salute tra gli altri per malati di fegato, alcolisti, epilettici, cerebrolesi, donne in gravidanza e donne in allattamento. L'effetto d'altri medicinali può essere migliorato o alterato.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre d'allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).



Si può assumere la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto durante la gravidanza o l'allattamento?

L'alcol può provocare danni al feto. Nel corso della gravidanza o in caso che si desideri una gravidanza o all'allattamento, per prudenza a causa del suo contenuto in alcol, dovrebbe rinunciare ad assumere la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto?

Adulti: prendere 15 ml della soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto a mezzogiorno e alla sera prima dei pasti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

In linea generale, il trattamento può avere una durata di 1-2 mesi. Per motivi di sicurezza, prima di un uso protratto è tuttavia necessario consultare il medico.

L'utilizzo e la sicurezza della soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto sui bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni non sono ancora stati verificati e pertanto il medicamento non deve essere somministrato a bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni.

Quali effetti collaterali può avere la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto?

In casi rari, una somministrazione ad alto dosaggio della soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto può provocare disturbi gastrici. Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Un intorbidamento eventuale o la formazione di un deposito è normale per questo prodotto. Agitare bene prima dell'uso! Conservi il medicamento fuori dalla portata dei bambini a temperatura ambiente (15-25°C). Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con EXP sul contenitore. Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni. Il preparato è anche disponibile senza alcol (capsule).

Cosa contiene la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto?

15 ml della soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto contengono: 0,83 ml di estratto fluido della radice rossa di Panax Ginseng C.A. Meyer (DER: 1-1,2:1), solvente di estrazione: etanolo 60%; vino dolce. Contiene 14% vol. d'alcol.

Numero dell'omologazione

42072 (Swissmedic).

Dove è ottenibile la soluzione orale Panax Ginseng Pine Brand Estratto? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi da 300 ml.

Titolare dell'omologazione

PANAX-Import, F. Ruckstuhl + Co., 9500 Wil SG



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

