

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere il medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Diamox®

Che cos'è Diamox e quando si usa?

L'acetazolamide, il principio attivo de Diamox, provoca un aumento dell'escrezione d'acqua tramite l'urina (diuresi).

A livello dell'occhio ciò determina una riduzione della pressione intraoculare. Perciò Diamox si usa per la terapia del glaucoma.

In caso di disturbi respiratori, Diamox migliora la ricettività del centro respiratorio. Il medicamento si usa per la profilassi del mal di montagna.

Diamox ha un influsso favorevole sugli edemi cerebrali (accumuli d'acqua nel cervello) e su certe forme di epilessia.

Il medicamento diminuisce la secrezione pancreatica.

Su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Durante una terapia a lunga scadenza con Diamox bisogna provvedere ad un apporto sufficiente di potassio, mediante una dieta adeguata (verdura, frutta, specialmente albicocche secche) o la somministrazione di medicinali a base de potassio. Il medico deciderà riguardo a questo.

Quando non si può assumere Diamox?

Diamox non deve essere utilizzato:

- in caso di ipersensibilità nota ai sulfamidici, ai derivati dei sulfamidici (inclusa l'acetazolamide) o a uno degli ingredienti di Diamox;
- in caso di gravi malattie del fegato;
- se soffre (o ha sofferto) di gravi disturbi ai reni;
- se soffre di insufficienza corticosurrenale (nota anche come malattia di Addison);
- in caso di livelli troppo bassi di sodio e/o potassio o di livelli elevati di cloruro nel sangue;

L'uso e la sicurezza di Diamox in bambini e adolescenti non sono mai stati studiati.

Chieda consiglio al suo medico nel caso avesse una qualsiasi di queste controindicazioni.

Una terapia a lunga scadenza con Diamox non è indicata nei pazienti affetti da glaucoma cronico non grave con occlusione dei condotti di deflusso delle lacrime.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Diamox?

Diamox può provocare sonnolenza o confusione, o influire sull'acuità visiva, e quindi ridurre la reattività, la capacità di guidare e la capacità di utilizzare attrezzi e macchinari! Se dopo aver assunto Diamox nota uno di questi effetti collaterali, non deve guidare né utilizzare macchinari.

Informi il suo medico se

- soffre o ha sofferto di disturbi ai reni come i calcoli;



- se soffre di malattie polmonari come enfisema o bronchite cronica, con una funzione respiratoria limitata;
- se in passato ha avuto problemi polmonari o respiratori (presenza di liquido nei polmoni) in seguito all'assunzione di acetazolamide. Se dopo l'assunzione di Diamox sviluppa respiro affannoso o respirazione difficoltosa, richieda immediatamente assistenza medica.
- soffre di diabete o disturbi della glicemia;
- ha più di 65 anni;
- se soffre di gotta
- nota un'eruzione cutanea (sfogo sulla pelle) o un qualsiasi altro sintomo di allergia.

Una diminuzione della vista o dolore agli occhi potrebbero essere sintomi di accumulo di liquido nello strato di vasi sanguigni dell'occhio (effusione coroideale o distacco della coroide). Ciò può verificarsi entro poche ore dall'assunzione di Diamox. Si rivolga immediatamente al medico se manifesta questi sintomi.

Alcune persone in cura contro l'epilessia con medicinali come l'acetazolamide hanno avuto pensieri autolesionistici o suicidi; se ha avuto pensieri di questo tipo, deve immediatamente contattare il suo medico.

Informi il suo medico o il farmacista se assume o ha assunto di recente altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!). Questo riguarda soprattutto i seguenti medicinali, che possono influire sull'efficacia di Diamox:

- probenecid e sulfinpyrazone aumentano l'effetto terapeutico di Diamox
- medicinali per il cuore come i glicosidi cardiaci (ad es. la digossina)
- medicinali per abbassare la pressione sanguigna
- medicinali per diluire il sangue (anticoagulanti)
- barbiturici
- medicinali contro il diabete, per abbassare il livello di zucchero nel sangue (ad es. la metformina)
- medicinali contro l'epilessia o le convulsioni (in particolare fenitoina, primidone, carbamazepina o topiramato)
- metotressato
- aspirina (acido acetilsalicilico) e medicinali analoghi, come l'acido salicilico o il salicilato di colina per le malattie della bocca
- inibitori della carboanidasi (utilizzati per il trattamento dell'aumento della pressione intraoculare)
- anfetamine (stimolanti), chinidina (per la cura del battito cardiaco irregolare; non è omologato in Svizzera) o litio (per il trattamento di gravi disturbi psichici)
- ciclosporina (utilizzata per l'immunosoppressione dopo i trapianti)

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente "senza sodio."

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Diamox durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono ancora state compiute indagini scientifiche controllate durante la gravidanza o l'allattamento; quindi non si deve prendere Diamox durante la gravidanza (soprattutto nei primi 3 mesi), se ritiene di



essere incinta o desidera restare incinta, a meno che non lo prescriva espressamente il medico. L'acetazolamide, il principio attivo di Diamox, passa nel latte materno. Durante l'allattamento deve chiedere al suo medico se può prendere Diamox.

Come usare Diamox?

Diamox viene prescritto dal medico in diversi dosaggi a seconda del campo di applicazione.

Adulti:

Posologia abituale, salvo diversa prescrizione del medico:

Glaucoma:	1. <i>in casi acuti</i> : 250-1000 mg (1 a 4 compresse) ripartiti nelle 24 ore 2. <i>terapia a lunga scadenza</i> : 125-250 mg ($\frac{1}{2}$ a 1 compr.) al giorno
Disturbi respiratori:	500-750 mg (2 a 3 compr.) al giorno
Epilessia:	250-1000 mg (1 a 4 compr.) ripartiti nelle 24 ore
Edemi:	all'inizio 250-375 mg al giorno (1 a 1½ compr.), in seguito 250-375 (1 a 1½ compr.) alla settimana
Profilassi del mal di montagna:	circa 500 mg (2 compr.) al giorno (inizio: 1 giorno prima della partenza)

La compressa è divisibile in due metà per il dosaggio.

L'utilizzazione e la sicurezza di Diamox su bambini e adolescenti non sono state dimostrate.

Se ha assunto più Diamox del previsto, deve chiedere subito aiuto a un medico, telefonando al suo medico oppure recandosi all'ospedale più vicino (pronto soccorso). Porti con sé le compresse avanzate e questo foglietto illustrativo, in modo che il medico capisca quale medicamento ha assunto.

Se dimentica una dose, deve assumerla non appena se ne ricorda. Se però mancano meno di 2 ore alla successiva compressa, non deve prendere la dose dimenticata. Non assuma mai una dose doppia in una volta sola.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Diamox?

- Reazioni allergiche. In caso di comparsa di reazioni allergiche gravi quali improvvisi disturbi della respirazione, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzione cutanea o prurito (soprattutto se colpisce tutto il corpo), contatti immediatamente il suo medico. Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10 000).
- Eruzioni cutanee. In caso di comparsa di sintomi gravi a carico della pelle, quali bolle o desquamazione della pelle intorno a labbra, occhi, bocca, naso e genitali, sintomi di tipo influenzale e febbre, dolore ai muscoli e alle articolazioni, malessere generale, interrompa il trattamento e consulti subito il suo medico. Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10 000).
- Acidosi (iperacidità del sangue): i sintomi sono ad esempio nausea, vomito, palpitazioni cardiache e mal di testa. Deve contattare immediatamente il suo medico o andare in ospedale. Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).



Grave reazione cutanea: eruzione cutanea rossa e squamosa con formazione di pustole e vescicole (pustolosi esantematica). Se riscontra sintomi analoghi, contatti immediatamente il suo medico.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

I seguenti effetti collaterali possono verificarsi anche con l'uso di Diamox:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

- Intorpidimento e formicolii della pelle e delle dita delle mani o dei piedi, sensazione di calore, calo delle prestazioni, capogiri, mal di testa
- Nausea, vomito, diarrea, mancanza di appetito o disturbi del gusto, stanchezza, feci nere o picee

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

- Depressione e confusione, eccitabilità, debolezza e paralisi muscolare, convulsioni, disturbi della coordinazione dei movimenti (atassia)
- Miopia
- Rumori nelle orecchie (tinnito) e disturbi dell'udito
- Abbassamento della pressione del sangue
- Maggiore difficoltà di respirazione in pazienti con malattie cardiache o polmonari
- Disturbi crampiformi a mani e piedi
- Rammollimento delle ossa (osteomalacia)
- Rallentamento della crescita nei bambini
- Aumento dello stimolo a urinare, insufficienza renale
- Dolore, spesso sotto forma di attacchi sui fianchi e nella parte bassa della schiena a causa di calcoli renali
- Aumento del calcio nelle urine e dell'acido urico nel sangue
- Sete, secchezza della bocca

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000)

- Epatite (ingrossamento e infiammazione del fegato); ittero (colorito giallo della pelle e degli occhi, urine di colore scuro, feci chiare)

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10 000)

- Shock
- Sensibilità alla luce
- Alterazioni del quadro ematologico (esami del sangue)
- Raccolta di liquidi nei tessuti polmonari (edema polmonare), compresi disturbi della respirazione, tosse con espettorato schiumoso misto a sangue e pallore della pelle. Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di respiro affannoso o respirazione difficoltosa. Questi possono essere sintomi di un accumulo di liquido nei polmoni (edema polmonare).
- Disturbi della funzionalità del fegato, necrosi del fegato (grave degenerazione delle cellule epatiche)
- Presenza di sangue o glucosio nelle urine

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

- Diminuzione della produzione di cellule del sangue nel midollo osseo
- Riduzione del numero di cellule del sangue (pancitopenia)



- Articolazioni arrossate, calde, gonfie (attacco di gotta)
- Colica renale e urinaria
- Arrossamento della pelle, eruzione cutanea, sensazione di calore, diminuzione della libido, febbre
- Diminuzione della vista o dolore agli occhi a causa dell'accumulo di liquido nello strato strato di vasi sanguigni dell'occhio (effusione coroideale o distacco della coroide).

Inoltre, Diamox può provocare effetti collaterali che normalmente non si notano, come alterazioni degli elettroliti (sali). Può essere modificato il livello degli zuccheri nel sangue. Parli con il suo medico. In caso di terapia a lungo termine con questo medicamento, è necessario controllare regolarmente il sangue.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Diamox può influire su alcuni esami di laboratorio. Se va in ospedale o in un ambulatorio per gli esami di laboratorio, deve informare il medico di turno che sta assumendo Diamox.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Diamox?

1 compressa di Diamox contiene

Principi attivi

250 mg di acetazolamide

Sostanze ausiliarie

Povidone K 30, carbossimetilamido sodico (tipo C), amido di mais, calcio fosfato dibasico diidrato, magnesio stearato

Numero dell'omologazione

21191 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Diamox? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.



Disponibile in confezioni da 25 compresse (con linea di frattura a croce, divisibili in quattro parti).

Titolare dell'omologazione

Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH, Zürich

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

