

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Plak-Out Collutorio

È soggetto alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope.

Che cos'è Plak-Out Collutorio e quando si usa?

Un'igiene orale meccanica inadeguata o difficoltosa comporta una formazione eccessiva di placca causata da depositi batterici sulla superficie dei denti. Questi depositi batterici possono anche causare gengive infiammate, sanguinanti, arrossate e doloranti. La cloressidina contenuta in Plak-Out Collutorio è indicata per l'igiene orale grazie all'azione inibitrice della formazione dei depositi batterici (placca) sulla superficie dei denti. La cloressidina, sostanza ad azione antisettica, svolge azione battericida e fungicida. Risciacqui orali con Plak-Out Collutorio sono indicati in casi di scarsa igiene dentale, per infiammazioni gengivali o del letto dentale, nei casi di carie acute e di igiene orale difficoltosa.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

L'uso del Plak-Out Collutorio non sostituisce la pulizia meccanica dei denti, ma può rappresentare un valido ausilio. Plak-Out Collutorio contiene alcol.

Quando non si può assumere/usare Plak-Out Collutorio?

Plak-Out Collutorio contiene cloressidina che, in casi molto rari, può provocare allergie. Segnali tipici sono prurito, generale arrossamento cutaneo, orticaria, asma o singole reazioni circolatorie. Tali sintomi richiedono sempre l'immediato consulto medico. Non utilizzare Plak-Out Collutorio nei casi conosciuti di allergia alla cloressidina nonché in caso d'ipersensibilità ad una delle sostanze contenute.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Plak-Out Collutorio?

Deglutire accidentalmente il collutorio non è pericoloso in quanto la cloressidina non viene assorbita nel tratto gastrointestinale.

Non usare il collutorio a base di cloressidina in combinazione con paste o soluzioni dentifricie poichè la cloressidina può essere inattivata. In presenza di infiammazioni radicolari si raccomanda di usare il prodotto con cautela.

Questo medicamento contiene un aroma a sua volta contenente: d-limonene e linalolo. Questi allergeni possono causare reazioni allergiche.

Questo medicamento contiene 700 mg di alcol (etanolo) per dose, equivalenti a 70 mg/ml (8.5% v/v). In caso di cute lesa, è possibile che venga avvertito bruciore.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o



- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Plak-Out Collutorio durante la gravidanza o l'allattamento?

Plak-Out Collutorio può essere utilizzato durante la gravidanza o l'allattamento soltanto su prescrizione medica.

Come usare Plak-Out Collutorio?

Se non prescritto diversamente dal medico procedere come segue:

Adulti e ragazzi a partire da 12 anni:

Risciacquare la bocca con 10 ml Plak-Out Collutorio non diluito, da 2 a 3 volte al giorno (dosaggio con il misurino allegato). Cominciare con risciacqui di breve durata (10-15 secondi), poi sputare. L'azione antiplacca verrà aumentata con il prolungamento della durata del risciacquo fino a 3-4 minuti. L'uso di Plak-Out Collutorio con tempi lunghi di risciacquo è indicato negli adulti per il trattamento di infezioni sub-acute e croniche (gengiviti, ascessi delle tasche gengivali), in modo particolare in caso di elevata sensibilità delle mucose della bocca e della faringe. Si sconsiglia di utilizzare Plak-Out Collutorio per più di 2 settimane senza interruzioni, se non previa raccomandazione del medico o del dentista.

L'uso e la sicurezza di Plak-Out Collutorio nei bambini e negli adolescenti sotto i 12 anni finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Plak-Out Collutorio?

Con l'applicazione di Plak-Out Collutorio possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Spesso sulla lingua si osservano colorazioni brune, non pericolose, che sono solo un problema estetico. Con l'uso prolungato spesso si formano sui denti colorazioni che scompaiono nella maggior parte dei casi a trattamento terminato. Eventuali depositi di color giallo/brunastro che si formano gradualmente negli spazi interdentali, possono essere facilmente eliminati dal dentista o dall'igienista dentale.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Dopo risciacqui a base di cloressidina, occasionalmente possono verificarsi alterazioni del gusto.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.



Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Plak-Out Collutorio?

1 ml di collutorio contiene:

Principi attivi

Cloressidina digluconato 1.0 mg.

Sostanze ausiliarie

Alcol (8.5% v/v), aromi (contiene d-limonene e linalolo), lauromacrogol 400, sciroppo di glucosio idrogenato 80/55, eritrosina (E127), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

47887 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Plak-Out Collutorio? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone da 250 ml di collutorio con misurino da 30 ml (attualmente non in commercio).

Titolare dell'omologazione

Tapadar GmbH, CH-5600 Lenzburg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

