

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie Nebenwirkungen melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Kapitel «Welche Nebenwirkungen kann Hymravzi haben?».

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Hymravzi®

Pfizer AG

Was ist Hymravzi und wann wird es angewendet?

Auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin.

Hymravzi enthält den Wirkstoff «Marstacimab». Marstacimab ist ein monoklonaler Antikörper (eine Eiweiss- bzw. Proteinart), der eine bestimmte Zielstruktur im Körper namens Gewebefaktor-Inhibitor (tissue factor pathway inhibitor, TFPI) erkennt und daran bindet.

Hymravzi ist ein Arzneimittel, das zur Vorbeugung oder Reduzierung von Blutungen bei Patienten ab einem Alter von 12 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 35 kg eingesetzt wird, die

- eine schwere Hämophilie A (angeborener Faktor-VIII-Mangel mit einem Faktor-VIII-Spiegel im Blut unter 1%) und keine Faktor-VIII-Inhibitoren haben oder
- eine schwere Hämophilie B (angeborener Faktor-IX-Mangel mit einem Faktor-IX-Spiegel im Blut unter 1%) und keine Faktor-IX-Inhibitoren haben.

Hämophilie A ist eine angeborene Erkrankung, die durch einen Mangel an Faktor VIII ausgelöst wird. Hämophilie B ist eine angeborene Erkrankung, die durch einen Mangel an Faktor IX ausgelöst wird. Faktor VIII und Faktor IX sind wichtige Substanzen, die zur Gerinnung des Blutes und zum Stillen von Blutungen benötigt werden.

Der Wirkstoff in Hymravzi, Marstacimab, erkennt und bindet an TFPI, ein Protein, das Blut daran hindert zu stark zu gerinnen. Durch die Bindung an TFPI verringert Marstacimab die Wirksamkeit von TFPI, wodurch die Bildung von Thrombin (einem Protein, das bei Verletzungen oder Schäden am Körper eine entscheidende Rolle bei der Blutgerinnung spielt) gefördert wird. Das hilft die Blutgerinnung zu verstärken und Blutungen zu stoppen bei Patienten, die an Hämophilie leiden.

Wann darf Hymravzi nicht angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegenüber Marstacimab oder einem der in Hymravzi enthaltenen Hilfsstoffe (siehe «Was ist in Hymravzi enthalten?»).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Allergie haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Hymravzi anwenden.

Wann ist bei der Anwendung von Hymravzi Vorsicht geboten?

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, bevor Sie Hymravzi anwenden.

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich vor Beginn der Anwendung von Hymravzi von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin erklären lassen, wie Sie Faktor-VIII- und Faktor-IX-Präparate (Arzneimittel, welche die Blutgerinnung unterstützen, aber anders funktionieren als Hymravzi) während der Anwendung von Hymravzi anwenden dürfen. Es kann sein, dass Sie ein Faktor-VIII- oder Faktor-IX-Präparat benötigen, um während der Anwendung von Hymravzi Durchbruchblutungen zu behandeln. Halten Sie sich genau an die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin oder des medizinischen Fachpersonals im Hinblick darauf,



wann und wie das Faktor-VIII- oder Faktor-IX-Präparat während der Anwendung von Hymravzi angewendet werden soll.

Blutgerinnsel (thromboembolische Ereignisse)

Hymravzi verstärkt die Blutgerinnung. Hymravzi und ähnliche Arzneimittel können die Bildung von Blutgerinnseln in den Blutgefässen verursachen (sogenannte thromboembolische Ereignisse). Blutgerinnsel können lebensbedrohlich sein. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, wenn bei Ihnen in der Vergangenheit Blutgerinnsel aufgetreten sind, oder Sie eine Erkrankung oder andere Faktoren haben, die Ihr Risiko für Blutgerinnsel erhöht. Dazu gehören:

- koronare Herzkrankheit in der Vorgeschichte (Herzerkrankung durch eine Verengung oder Verstopfung der Blutgefässe, die den Herzmuskel versorgen).
- ischämische Erkrankung in der Vorgeschichte (verminderter Blutfluss aufgrund verengter oder blockierter Blutgefässe).
- Blutgerinnsel in Venen oder Arterien in der Vorgeschichte.
- bestimmte Gendefekte, die das Risiko für Blutgerinnsel erhöhen können (zum Beispiel Faktor-V-Leiden-Mutation).
- längere Phasen der Immobilität (z.B. Bettlägrigkeit).
- Übergewicht.
- Rauchen.
- derzeit bestehende schwere Infektionen.
- derzeit bestehende Sepsis (Blutvergiftung).
- derzeit bestehende Verletzung oder Quetschung.
- derzeit bestehende Krebserkrankung.

Beenden Sie die Anwendung von Hymravzi und sprechen Sie sofort mit einem Arzt oder einer Ärztin, wenn Sie Symptome eines möglichen Blutgerinnsels, einschliesslich folgender Nebenwirkungen, bemerken:

-
- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Schwellung oder Schmerzen in Armen oder Beinen | • Schwächegefühl |
| • Rötung oder Verfärbung an Armen oder Beinen | • Kopfschmerzen |
| • Kurzatmigkeit | • Taubheitsgefühl im Gesicht |
| • Schmerzen im Brustkorb oder im oberen Rücken | • Augenschmerzen oder -schwellung |
| • Schnelle Herzfrequenz | • Sehstörungen |
| • Blutiger Husten | |
-

Allergische Reaktionen

Unter der Anwendung von Hymravzi wurden Symptome beobachtet, die auf eine allergische Reaktion hindeuten können. Beenden Sie die Anwendung von Hymravzi und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie während der Anwendung von Hymravzi Symptome einer möglichen schweren allergischen Reaktion bemerken, einschliesslich der folgenden:

-
- | | |
|---|---|
| • Hautausschlag, Nesselsucht allgemeiner Juckreiz | • Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken |
|---|---|
-



- Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder Rachen
 - Schwindel
-

Polysorbatgehalt

Dieses Arzneimittel enthält Polysorbat 80. Polysorbate können allergische Reaktionen auslösen. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin, wenn bei Ihnen Allergien bekannt sind.

Natriumgehalt

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Fertigen, d.h. es ist nahezu «natriumfrei».

Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von Maschinen

Hympavzi hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit oder die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.

Kinder unter 12 Jahren

Hympavzi ist nicht zur Anwendung bei Personen unter 12 Jahren zugelassen bzw. empfohlen. Die Sicherheit und der Nutzen dieses Arzneimittels in dieser Altersgruppe sind bisher nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin, wenn Sie bzw. Ihr Kind

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen (oder äusserlich anwenden).

Darf Hympavzi während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Wenn Sie schwanger werden könnten, sollten Sie während der Behandlung mit Hympavzi und mindestens 12 Wochen nach der letzten Injektion von Hympavzi eine zuverlässige Methode zur Empfängnisverhütung (Schwangerschaftsverhütung) anwenden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin um Rat. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird den Nutzen der Anwendung von Hympavzi gegen das Risiko für Ihr Baby abwägen.

Wie verwenden Sie Hympavzi?

Ein für die Behandlung von Patienten mit Hämophilie qualifizierter Arzt bzw. eine Ärztin wird Ihre Behandlung mit Hympavzi einleiten. Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Ihrer Apothekerin nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Bei einer Umstellung von einer Faktor-basierten oder einer Nicht-Faktor-basierten Therapie auf Hympavzi wird Ihnen Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin Anweisungen zum Beenden (Absetzen) Ihrer aktuellen Behandlung geben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, wenn Sie nicht sicher sind, was Sie tun müssen.

Wenn Sie schwer krank sind oder sich einem grösseren Eingriff unterziehen müssen, teilen Sie Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin mit, dass Sie Hympavzi anwenden.

Die Anwendung aufzeichnen

Es wird empfohlen, dass Sie bei jedem Gebrauch von Hympavzi den Namen und die Chargennummer des Produktes notieren.

In welcher Dosierung wird Hympavzi angewendet?



Die Behandlung sollte in einem blutungsfreien Zeitraum begonnen werden. Ihre Behandlung beginnt mit einer Anfangsdosis (eine höhere Dosis, um den Wirkstoffspiegel im Blut rasch anzuheben), auf die dann die einmal pro Woche verabreichte Erhaltungsdosis folgt.

- Anfangsdosis: Die empfohlene Dosis beträgt 300 mg.
- Erhaltungsdosis: Die empfohlene Dosis beträgt 150 mg einmal wöchentlich.

Das Arzneimittel sollte einmal wöchentlich (zu einer beliebigen Tageszeit) jeweils am selben Wochentag angewendet werden.

Sie sollten sich notieren, an welchem Wochentag Sie Hymfavzi anwenden, um die einmal wöchentliche Injektion des Arzneimittels nicht zu vergessen.

Je nachdem, wie Sie auf Hymfavzi ansprechen, kann Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin Ihre Erhaltungsdosis bei Bedarf bis zu einer Höchstdosis von 300 mg pro Woche anpassen.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Wie wird Hymfavzi angewendet?

Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin, das medizinische Fachpersonal oder Ihr Apotheker bzw. Ihre Apothekerin wird Ihnen und/oder Ihrer Betreuungsperson zeigen, wie Hymfavzi injiziert wird. **Wenn Sie sich Hymfavzi selbst injizieren oder Ihre Betreuungsperson Ihnen das Arzneimittel injiziert, müssen Sie bzw. muss Ihre Betreuungsperson den Abschnitt «Gebrauchsanweisung» am Ende dieser Packungsbeilage sorgfältig durchlesen und die ausführlichen Anweisungen genau befolgen.**

- Hymfavzi ist als Fertigpen erhältlich.
- Bevor Sie den Pen zum ersten Mal verwenden, zeigt Ihnen Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin oder das medizinische Fachpersonal, wie er verwendet wird.
- Für eine angenehmere Injektion kann Hymfavzi im Umkarton vor direktem Sonnenlicht geschützt etwa 15 bis 30 Minuten vor der Anwendung auf Raumtemperatur gebracht werden. Hymfavzi darf nicht auf andere Art und Weise erwärmt werden. Erwärmen Sie es zum Beispiel nicht in heissem Wasser oder in der Mikrowelle.
- Hymfavzi wird als Injektion unter die Haut verabreicht (subkutane Injektion). Injizieren Sie es nicht in eine Vene oder einen Muskel.
- Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin oder das medizinische Fachpersonal wird Ihnen und/oder Ihrer Betreuungsperson zeigen, in welche Körperstellen Hymfavzi injiziert werden sollte. Die besten Stellen für die Verabreichung von Hymfavzi sind der Bauchbereich oder die Oberschenkel. Injektionen in das Gesäss sollten immer nur von einer Betreuungsperson verabreicht werden.
- Wechseln Sie bei jeder Injektion von einer Injektionsstelle zur nächsten.
- Falls für die Verabreichung der vollständigen Dosis mehr als eine Injektion erforderlich ist, sollte für jede Injektion eine andere Injektionsstelle gewählt werden.
- Wenn Sie noch weitere Arzneimittel anwenden, die unter die Haut injiziert werden müssen, sind für diese Injektionen andere Injektionsstellen zu wählen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Hymfavzi kann bei Jugendlichen ab 12 Jahren angewendet werden. Ein/e Jugendliche/r kann sich das Arzneimittel selbst injizieren, sofern der Arzt bzw. die Ärztin der/des Jugendlichen oder das medizinische Fachpersonal und die Eltern oder die Betreuungsperson zustimmen und der Patient/die Patientin darin geschult ist.

Die Anwendung und Sicherheit von Hymfavzi bei Kindern unter 12 Jahren ist bisher nicht geprüft worden. Hymfavzi sollte bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.



Wenn Sie eine grössere Menge von Hympavzi angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine grössere Menge von Hympavzi als angewiesen angewendet haben, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin. Es besteht die Gefahr, dass bei Ihnen Nebenwirkungen wie Blutgerinnsel auftreten und Sie ärztliche Hilfe benötigen. Wenden Sie Hympavzi immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn Sie die Anwendung von Hympavzi vergessen haben

Wenn Sie Ihre geplante Dosis vergessen haben, injizieren Sie die versäumte Dosis so bald wie möglich vor dem Tag der nächsten geplanten Dosis. Setzen Sie dann die Injektion des Arzneimittels wie geplant fort. Injizieren Sie keine doppelte Dosis als Ausgleich für eine vergessene Dosis.

Wenn Sie zwei geplante Dosen hintereinander vergessen haben (das heisst, dass seit Ihrer letzten Injektion mehr als 13 Tage vergangen sind), fragen Sie so rasch wie möglich bei Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin nach, was Sie tun sollen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder das medizinische Fachpersonal.

Wenn Sie die Anwendung von Hympavzi abbrechen

Brechen Sie die Anwendung Hympavzi nicht ab, ohne mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin Rücksprache zu halten. Wenn Sie die Anwendung von Hympavzi abbrechen, sind Sie möglicherweise nicht mehr vor Blutungen geschützt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder das medizinische Fachpersonal.

Welche Nebenwirkungen kann Hympavzi haben?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Schwerwiegende Nebenwirkungen

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1'000 Behandelten)

Ausschlag: Wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, wenn Sie einen starken Ausschlag bekommen, da einige Ausschläge schwerwiegend sein können. Setzen Sie die Behandlung mit Hympavzi erst fort, wenn Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin über Ihren Ausschlag gesprochen haben.

Blutgerinnsel: Hympavzi kann Blutgerinnsel (thromboembolische Ereignisse) verursachen. Brechen Sie die Anwendung von Hympavzi ab und kontaktieren Sie umgehend Ihren Arzt, wenn Sie Anzeichen oder Symptome eines möglichen Blutgerinnsels bemerken. Eine Liste der möglichen Symptome eines Blutgerinnsels (thromboembolisches Ereignis) finden Sie im Abschnitt «Wann ist bei der Anwendung von Hympavzi Vorsicht geboten?».

Andere Nebenwirkungen

Sehr häufig (betrifft mehr als einen von 10 Behandelten)

Eine Reaktion an der Stelle, an der die Injektion verabreicht wurde (einschliesslich Juckreiz, Schwellung, Rötung, Schmerzen, Bluterguss, Verhärtung).

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Behandelten)

Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Juckreiz.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Ihre Ärztin, Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?



Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Im Kühlschrank (2-8 °C) lagern. Nicht einfrieren.

Nicht schütteln.

Den Behälter im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hypavzi kann aus dem Kühlschrank entnommen und in der Originalverpackung bis zu maximal 7 Tagen bei Raumtemperatur (bis zu 30 °C) gelagert werden. Stellen Sie Hypavzi nicht wieder in den Kühlschrank zurück, nachdem es bei Raumtemperatur gelagert wurde. Wurde Hypavzi länger als 7 Tage bei Raumtemperatur gelagert, entsorgen Sie es, auch wenn noch ungebrauchtes Arzneimittel enthalten ist.

Nehmen Sie Hypavzi vor der Anwendung aus dem Kühlschrank. Für eine angenehmere Injektion kann Hypavzi etwa 15 bis 30 Minuten vor der Anwendung im Umkarton vor direktem Sonnenlicht geschützt auf Raumtemperatur gebracht werden.

Prüfen Sie das Arzneimittel vor der Anwendung auf Partikel oder Verfärbungen. Wenden Sie das Arzneimittel nicht an, wenn Sie bemerken, dass es trübe oder dunkelgelb ist oder Flocken oder Partikel enthält.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Hypavzi enthalten?

Hypavzi ist eine klare und farblose bis hellgelbe Injektionslösung in einem Fertigpen. Jeder Fertigpen enthält 1 ml Lösung.

Wirkstoffe

Hypavzi Injektionslösung im Fertigpen: Jeder Fertigpen enthält 150 mg Marstacimab in 1 ml Lösung.

Hilfsstoffe

Dinatriumedetat, L-Histidin, L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Polysorbat 80, Saccharose, Wasser für Injektionszwecke.

Zulassungsnummer

69556 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Hypavzi? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken gegen ärztliche Verschreibung, die nur zum einmaligen Bezug berechtigt.

Packung mit 1 Fertigpen mit 150 mg/1 ml [A].

Zulassungsinhaberin

Pfizer AG, Zürich.

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

PIL V004

GEBRAUCHSANWEISUNG

Hypavzi, 150 mg Injektionslösung im Fertigpen

Diese Gebrauchsanweisung enthält Informationen darüber, wie Hypavzi zu injizieren ist.



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Hymfavzi Fertigpen verwenden, und jedes Mal, wenn Sie ihn erneut verschrieben bekommen, da neue Informationen enthalten sein können.

Vor der ersten Anwendung sollte Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin, das medizinische Fachpersonal oder Ihr Apotheker bzw. Ihre Apothekerin Ihnen oder Ihrer Betreuungsperson zeigen, wie eine Dosis Hymfavzi korrekt vorzubereiten und zu injizieren ist. **Sie dürfen sich selbst oder einer anderen Person erst dann Hymfavzi injizieren, wenn Ihnen vorher gezeigt wurde, wie dies gemacht wird.**

Wichtige Informationen

- Jeder Hymfavzi Fertigpen ist ein Einzeldosis-Fertigpen (in dieser Gebrauchsanweisung als «Pen» bezeichnet). Der Hymfavzi Fertigpen enthält 150 mg Marstacimab für die Injektion unter die Haut (subkutan).
- Injizieren Sie Hymfavzi **nicht** in eine Vene oder einen Muskel.
- Schütteln Sie Hymfavzi **nicht**.
- Damit Sie daran denken, wann Sie Hymfavzi injizieren sollten, können Sie die entsprechenden Tage bereits im Voraus im Kalender markieren. Kontaktieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin an, wenn Sie oder Ihre Betreuungsperson Fragen zur korrekten Injektion von Hymfavzi haben.

Wie ist Hymfavzi aufzubewahren?

- Bewahren Sie nicht verwendete Dosen von Hymfavzi im Kühlschrank bei 2-8 °C auf. Hymfavzi **nicht einfrieren**.
- Bewahren Sie Hymfavzi in der Originalverpackung vor direktem Sonnenlicht geschützt auf.
- Falls erforderlich, kann Hymfavzi in der Originalverpackung maximal 7 Tage lang bei Raumtemperatur bis 30 °C gelagert werden. Verwenden Sie Hymfavzi **nicht**, wenn es länger als 7 Tage ungekühlt gelagert wurde. Entsorgen Sie alle Dosen von Hymfavzi, die länger als 7 Tage bei Raumtemperatur gelagert wurden.
- Der Pen darf nach Ablauf des auf dem Hymfavzi Fertigpen aufgedruckten Verfalldatums **nicht** verwendet werden.
- Bewahren Sie Hymfavzi und alle anderen Arzneimittel ausser der Reichweite von Kindern auf.


Für die Injektion von Hymfavzi benötigte Materialien

Legen Sie die folgenden Materialien auf einer sauberen, ebenen Oberfläche bereit:


- 1 Hymfavzi Fertigpen.
- 1 Alkoholtupfer (nicht enthalten).
- 1 Wattebausch oder Gazetupfer (nicht enthalten).
- 1 geeigneten Entsorgungsbehälter für scharfe oder spitze Gegenstände zur Entsorgung des Pens (nicht enthalten).



Hympavzi Fertigpen VOR der Anwendung:



Hympavzi Fertigpen NACH der Anwendung:



Vorbereitende Schritte

Schritt 1 – Vorbereitung

Entnehmen Sie den Pen aus der Verpackung, und halten Sie ihn vor direktem Sonnenlicht fern.


- **Vergewissern** Sie sich, dass auf der Verpackung und auf dem Etikett des Pens Hympavzi steht.
- **Überprüfen Sie den Pen** auf sichtbare Beschädigungen wie Risse oder undichte Stellen.
- **Waschen und trocknen** Sie Ihre Hände.
- **Nehmen Sie die Kappe erst ab, wenn Sie bereit für die Injektion sind.**
- **Entsorgen** Sie den Pen, wenn er beschädigt ist oder wenn die Packung mit dem Pen heruntergefallen ist.
- In den folgenden Fällen darf der Pen **nicht** verwendet werden:
 - wenn er unter direkter Lichteinstrahlung aufbewahrt wurde. Die Exposition gegenüber Raumlicht während der Vorbereitung der Dosis und Injektion ist zulässig.
 - wenn er eingefroren war oder aufgetaut wurde oder wenn er länger als 7 Tage ausserhalb des Kühlschranks gelagert wurde.
- Schütteln Sie den Pen **nicht**. Das Schütteln kann Hympavzi beschädigen.

Hinweis: Für eine angenehmere Injektion kann der Pen im Umkarton und vor direktem Sonnenlicht geschützt etwa 15 bis 30 Minuten lang auf Raumtemperatur gebracht werden.

Erwärmen Sie den Pen **nicht** auf andere Weise, wie beispielsweise in der Mikrowelle oder in heissem Wasser.


Schritt 2 – Verfalldatum prüfen (EXP)





- **Prüfen** Sie das auf dem Etikett des Pens aufgedruckte Verfalldatum (EXP).
- Pens mit abgelaufenem Verfalldatum dürfen **nicht** verwendet werden.

Schritt 3 – Arzneimittel prüfen




- **Schauen** Sie sich das Arzneimittel sorgfältig durch das Sichtfenster des Pens an.
 - Das Arzneimittel sollte klar und farblos bis hellgelb sein.
 - Wenden Sie den Pen **nicht** an, wenn das Arzneimittel trübe oder dunkelgelb ist oder Flocken oder Partikel enthält.

Hinweis: Es ist normal, wenn Luftblasen im Sichtfenster zu sehen sind.

Wenn Sie Fragen zu diesem Arzneimittel haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin.






- **Wählen** Sie eine Injektionsstelle im Bauchbereich oder an den Oberschenkeln, sofern Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin oder das medizinische Fachpersonal keine andere Stelle vorgeschlagen hat. Hymfavzi kann auch in das Gesäss injiziert werden. Dies gilt jedoch nur bei Verabreichung durch einen Arzt bzw. eine Ärztin, medizinisches Fachpersonal oder eine Betreuungsperson. Achten Sie bei einer Injektion in den Bauch auf einen Abstand von mindestens 5 cm zum Bauchnabel.
- **Wählen** Sie für jede Injektion eine andere Injektionsstelle, wenn Sie sich Hymfavzi selbst verabreichen. Sie können denselben Körperbereich wählen, sollten jedoch eine andere Injektionsstelle in diesem Bereich verwenden.
- **Reinigen** Sie die Injektionsstelle mit Wasser und Seife oder ggf. mit einem Alkoholtupfer.
- **Lassen** Sie die Stelle trocknen. Berühren Sie die gereinigte Injektionsstelle **nicht**, und trocknen Sie sie nicht mit einem Gebläse oder durch Pusten.
- Injizieren Sie Hymfavzi **nicht** im Bereich von Knochen oder in Bereichen, an denen die Haut Blutergüsse aufweist, gerötet, entzündet (empfindlich) oder verhärtet ist. Vermeiden Sie die Injektion in Bereiche mit Narben oder Dehnungsstreifen.
- Injizieren Sie Hymfavzi **nicht** in eine Vene oder einen Muskel.
- Injizieren Sie Hymfavzi **nicht** durch Kleidung hindurch.

Schritt 5 – Kappe abdrehen





- **Drehen** Sie die Kappe und **ziehen** Sie sie ab.
- **Entsorgen** Sie die Kappe sofort in einem Entsorgungsbehälter für scharfe oder spitze Gegenstände. Sie wird nicht mehr benötigt.

Hinweis:


- Es ist normal, wenn ein paar Tropfen des Arzneimittels an der Nadelspitze zu sehen sind.
- Die Nadelabdeckung bleibt beim Abnehmen der Kappe in der Kappe.

Achtung: Gehen Sie vorsichtig mit dem Pen um, da er eine Nadel enthält.

Legen oder drücken Sie Ihre Hand **nicht** auf den Nadelschutz. Andernfalls könnten Sie sich eine Nadelstichverletzung zuziehen.

Injektionsschritte

Schritt 6 – Arzneimittel injizieren



- **Drücken** Sie den Pen in einem Winkel von 90° **fest** gegen Ihre Haut, und **halten** Sie ihn **gedrückt**, bis die Injektion abgeschlossen ist (Schritt 6). Ein **1. Klicken** zeigt an, dass die Injektion startet.
- **Halten** Sie den Pen weiter fest gegen Ihre Haut **gedrückt**, während sich der gelbe Balken durch das Sichtfenster bewegt. Ein **2. Klicken** zeigt an, dass die Injektion **fast** abgeschlossen ist.



- **Zählen Sie nach dem 2. Klicken langsam bis 5**, um sicherzustellen, dass Sie die vollständige Dosis erhalten.


Heben Sie den Pen erst von der Haut ab, wenn Sie nach dem 2. Klicken langsam bis 5 gezählt haben und der gelbe Balken das Sichtfenster vollständig ausfüllt.

Hinweis: Beim Herunterdrücken des Pens wird die Nadel in Ihre Haut eingestochen. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin, das medizinische Fachpersonal oder Ihr Apotheker bzw. Ihre Apothekerin kann Sie auch anweisen, während der Injektion die Haut vorsichtig zu einer Hautfalte zusammenzudrücken.

Hinweis: Wenn Sie beim Herunterdrücken des Pens gegen Ihre Haut kein Klicken hören, versuchen Sie, fester zu drücken. Wenn Sie die Injektion immer noch nicht starten können, nehmen Sie einen neuen Hymfavzi Fertigpen.

Achtung: Wenn Sie sich nach dem Einstechen der Nadel in die Haut für eine andere Injektionsstelle entscheiden möchten, müssen Sie den Pen entsorgen und einen neuen Hymfavzi Fertigpen verwenden.

Schritt 7 – Pen abheben




- **Heben** Sie den Pen von Ihrer Haut ab.
 - Wenn ein kleiner Tropfen des Arzneimittels auf Ihrer Haut zu sehen ist, warten Sie bei Ihrer nächsten Injektion etwas länger, bevor Sie den Pen abheben.

Hinweis: Nachdem Sie den Pen von Ihrer Haut abgehoben haben, wird die Nadel automatisch abgedeckt und der Nadelschutz rastet ein.

Der Pen kann nicht wiederverwendet werden.

Schritt 8 – Sichtfenster prüfen



Schritt**8****Sichtfenster prüfen**

- **Prüfen** Sie das Sichtfenster, um sicherzustellen, dass das Arzneimittel vollständig injiziert wurde.

Befindet sich der gelbe Balken nicht in der Position wie in der Abbildung oben gezeigt, bedeutet das, dass Sie keine vollständige Dosis erhalten haben. Fragen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin um Rat.

Injizieren Sie keine weitere Dosis.

Schritt 9 – Nachsorge

Schritt**9****Nachsorge**

- **Drücken** Sie einen sauberen Wattebausch oder Gazetupfer einige Sekunden lang leicht auf die Injektionsstelle, wenn ein Tropfen Blut zu sehen ist.
- Die Stelle **nicht** reiben.

Hinweis: Wenn die Blutung nicht stoppt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin.





- **Entsorgen** Sie den gebrauchten Pen in einem Entsorgungsbehälter für scharfe oder spitze Gegenstände nach Anweisung Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin, des medizinischen Fachpersonals oder Ihres Apothekers bzw. Ihrer Apothekerin und im Einklang mit vor Ort geltenden Vorschriften.
- Entsorgen Sie Pens **nicht** im Haushaltsabfall.

