

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

WALA Magen-Darm Globuli velati, Globuli velati

Anthroposophisches Arzneimittel

Wann wird WALA Magen-Darm Globuli velati angewendet?

Gemäss der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis kann WALA Magen-Darm Globuli velati bei Verdauungsbeschwerden im Magen-Darm-Trakt angewendet werden, wie:

- Verdauungsschwäche
- Übelkeit
- Erbrechen
- Blähungen

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.

Was sollte dazu beachtet werden?

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

WALA Magen-Darm Globuli velati wird angewendet bei Kindern ab 6 Monaten, Jugendlichen und Erwachsenen.

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt bzw. der Ärztin.

Bei Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Schwarzfärbung des Stuhls, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt bzw. eine Ärztin. aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob WALA Magen-Darm Globuli velati gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf WALA Magen-Darm Globuli velati nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

WALA Magen-Darm Globuli velati darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch (überempfindlich) auf Korbblütler oder einen anderen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.

Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Monaten.

Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.



Bitte nehmen Sie WALA Magen-Darm Globuli velati erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf WALA Magen-Darm Globuli velati während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie WALA Magen-Darm Globuli velati?

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kleinkinder und Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren: 3-mal täglich 3-5 Globuli velati

Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene: 3-mal täglich 5-10 Globuli velati

Bei Kindern unter 12 Jahren soll vor der Anwendung von WALA Magen-Darm Globuli velati ärztlicher Rat eingeholt werden.

Unter der Zunge zergehen lassen (sublingual).

Bei Kindern empfiehlt es sich, vor der Einnahme die angegebene Menge Globuli velati in einer kleinen Menge Wasser oder ungesüßtem Tee aufzulösen.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. an Ihre Ärztin.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann WALA Magen-Darm Globuli velati haben?

Für WALA Magen-Darm Globuli velati sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise



Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in WALA Magen-Darm Globuli velati enthalten?

In 1 g (ca. 40 Globuli velati) sind verarbeitet:

Wirkstoffe

45 mg Artemisia absinthium ex herba sicc. (Absinthii herba Ph.Eur.) Infusum TM (HAB 24a),

45 mg Gentiana lutea e radice sicc. (Gentianae radix Ph.Eur.) Decoctum TM (HAB 23a),

10 mg Strychnos nux-vomica e semine sicc. (Ph.Eur.Hom.) ferm 35b D4 (HAB 35b),

5 mg Taraxacum officinale e planta tota rec. ferm 34c TM (HAB 34c)

Hilfsstoffe

Saccharose (Zucker) 1g

Zulassungsnummer

67367 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie WALA Magen-Darm Globuli velati? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

WALA Magen-Darm Globuli velati sind in Packungen zu 20 g erhältlich.

Zulassungsinhaberin

WALA Schweiz AG, 3011 Bern

Diese Packungsbeilage wurde im September 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Revisions-Historie

Gesuchs ID	Meilenstein	Erstellt am	Änderung	Kürzel
102741969	Einreichung	29.09.2024	A.109	Pge
102741969	Verfügung	10.09.2026	A.109	AnS
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT
TEXT	TEXT	DATUM	TEXT	TEXT

