

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati, Globuli velati

Medicamento antroposofico

Quando si usa WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati?

Secondo la concezione antroposofica dell'uomo e della natura i WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati possono essere usati in caso di disturbi digestivi del tratto gastrointestinale, come:

- Indigestione
- Nausea
- Vomito
- Flatulenza

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi della concezione antroposofica dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di gravi forme di queste patologie, è indicata una terapia clinicamente comprovata.

WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati si usano nei bambini a partire da 6 mesi di età, negli adolescenti e negli adulti.

Il trattamento di una patologia acuta deve essere concluso dopo 2 settimane. La durata del trattamento di patologie croniche deve essere concordata con il medico.

Consultare il medico in caso di peggioramento delle condizioni generali, colorazione nera delle feci, disturbi persistenti, di natura non chiara o di nuova insorgenza poiché si può trattare di patologie che necessitano una valutazione medica.

Si rivolga al suo medico se dopo 3 giorni non si sente meglio o addirittura si sente peggio.

Quando non si può assumere/usare WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Non deve assumere WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati in caso di allergia (ipersensibilità) all'arnica o a uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicamento.

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 6 mesi.

I disturbi digestivi nei bambini con età inferiore a 12 anni devono essere sottoposti a valutazione medica.

Pertanto, il preparato non deve essere utilizzato in bambini di età inferiore a 12 anni in assenza di valutazione medica.

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui



- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Si può assumere / usare WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati?

La dose raccomandata è:

Bambini piccoli e bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni: 3-5 Globuli velati 3 volte al giorno

Bambini a partire da 6 anni di età, adolescenti e adulti: 5-10 Globuli velati 3 volte al giorno

Nei bambini di età inferiore a 12 anni si deve consultare il medico prima di utilizzare WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati.

Far sciogliere sotto la lingua (somministrazione sublinguale)

Per i bambini si raccomanda di sciogliere la dose prevista di Globuli velati in una piccola quantità di acqua o di tè senza zucchero prima dell'assunzione.

Si rivolga al suo medico se dopo 3 giorni non si sente meglio o addirittura si sente peggio.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati?

Sino a oggi non si sono osservati effetti collaterali per WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati se il medicamento è usato correttamente. Se tuttavia osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati?

In 1 g (circa 40 Globuli velati) sono inclusi:

Principi attivi



45 mg Artemisia absinthium ex herba sicc. (Absinthii herba Ph.Eur.) Infusum TM (HAB 24a),
45 mg Gentiana lutea e radice sicc. (Gentianae radix Ph.Eur.) Decoctum TM (HAB 23a),
10 mg Strychnos nux-vomica e semine sicc. (Ph.Eur.Hom.) ferm 35b D4 (HAB 35b),
5 mg Taraxacum officinale e planta tota rec. ferm 34c TM (HAB 34c)

Sostanze ausiliarie

1 g di saccarosio (zucchero)

Numero dell'omologazione

67367 (Swissmedic)

Dove è ottenibile WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. WALA Disturbi gastrointestinali Globuli velati sono disponibili in confezioni da 20 g.

Titolare dell'omologazione

WALA Schweiz AG, 3011 Berna

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel mese di settembre 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

