

PERTUDORON[®], Gouttes buvables

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand Pertudoron est-il utilisé?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, Pertudoron peut être utilisé pour le traitement de la toux irritative, des quintes de toux et de la coqueluche.

Selon les principes anthroposophiques, Pertudoron a un effet antitussif et antispasmodique et convient particulièrement pour le traitement de la toux spasmodique aiguë et chronique (s'accompagnant également d'une forte gêne respiratoire et de nausées).

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si Pertudoron peut être pris simultanément.

Quand Pertudoron ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

En cas de toux irritative, d'accès de toux spasmodique ou de coqueluche chez les jeunes enfants (âgés de 28 jours–23 mois), il est impératif de consulter un médecin. Par conséquent, Pertudoron ne doit être utilisé chez les jeunes enfants que sur prescription médicale. Ne pas utiliser chez les prématurés et les nouveau-nés (âgés de moins de 27 jours).

Si la toux persiste au-delà de 7 jours, veuillez également consulter un médecin, pharmacien ou droguiste. Pertudoron ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à la quinine (écorce de quinquina, *Cinchona pubescens*) ou à un autre composant.

Ce médicament contient 216mg d'alcool (éthanol) par 15 gouttes équivalent à 400mg/g (40% m/m). La quantité en 15 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 6ml de bière ou 2ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Pertudoron peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?



Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser Pertudoron?

Sauf prescription contraire de votre médecin, prenez Pertudoron comme suit:

Adultes et adolescents (à partir de 12 ans): 3 fois par jour 10–15 gouttes.

Enfants (âgés de 2–11 ans): 3 fois par jour 5–10 gouttes, diluer dans de l'eau (à cause de l'alcool).

Jeunes enfants (âgés de 28 jours–23 mois): uniquement sur prescription médicale: 3 fois par jour 3 gouttes, diluer dans de l'eau (à cause de l'alcool).

Ne pas utiliser chez les prématurés et les nouveau-nés (âgés de moins de 27 jours).

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires Pertudoron peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Pertudoron n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage: Conserver hors de portée des enfants et à température ambiante (15–25°C).

Remarques complémentaires: Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient Pertudoron?

1g de liquide contient:

Principes actifs: 100mg Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D3 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) / 100mg Cinchona pubescens, ethanol. Decoct. (HAB) D3 / 100mg Dactylopius coccus (HAB) D3 / 100mg Mephitis putorius e secreto glandulae analis D5 (Ph.Eur.Hom. 3.1.1) / 100mg Psychotria ipecacuanha, ethanol. Decoct. (HAB) D3 / 100mg Veratrum album, ethanol. Decoct. (HAB) D3 / 50mg Drosera (HAB) D1.

Excipients: eau purifiée, éthanol (alcool).

Contient 47% vol. d'alcool.

1g correspond à 28 gouttes.

Numéro d'autorisation

17497 (Swissmedic)



Où obtenez-vous Pertudoron? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes à 20ml.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26345200 / 2

