

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Perskindol® Cool con Sinfito

VERFORA SA

Che cos'è Perskindol Cool con Sinfito e quando si usa?

Perskindol Cool con Sinfito è un medicamento topico solo per uso esterno. Il gel contiene sinfite e levomentolo. Il levomentolo ha un'azione antinfiammatoria. Il gel contiene inoltre un ingrediente lenitivo di origine vegetale che rinfresca la pelle e riduce il dolore. È indicato per il trattamento sintomatico di distorsioni e stiramenti, tendiniti, tenosinoviti, periostiti, tendinite di Achille ed epicondilite (gomito del tennista). I principi attivi di Perskindol Cool con Sinfite penetrano rapidamente nella pelle, agendo direttamente sulle articolazioni e sui tessuti sottostanti.

Quando non si può usare Perskindol Cool con Sinfite?

In caso di ipersensibilità nota a uno dei componenti (v. composizione). Il suo uso è inoltre controindicato nei neonati e nei bambini piccoli.

Questo medicamento contiene 470,5 mg di alcol (etanolo) per 1 g di gel. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Perskindol Cool con Sinfite?

Non applichi il gel su ferite aperte, pelle con eczema o sulle mucose! Eviti il contatto con gli occhi. Utilizzi solo garze permeabili all'aria. Se il medicamento è usato correttamente, non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie (allergia al sinfite), assume altri medicamentos (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Perskindol Cool con Sinfite durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nei limiti del possibile ad assumere medicamentos durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al medico o farmacista.

Come usare Perskindol Cool con Sinfite?

Adulti e bambini a partire dai 3 anni

Salvo diversa prescrizione, applicare uno strato sottile di gel (una striscia lunga da 3 a 5 cm, a seconda delle dimensioni dell'area dolorosa), massaggiando. Lavarsi le mani dopo l'uso. Ripetere l'applicazione secondo il bisogno fino a 5 volte al giorno.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione di Perskindol Cool con Sinfite sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

L'uso e la sicurezza di questo prodotto nei bambini piccoli non sono ancora stati studiati.

Non sono state finora determinate le modalità d'uso e la sicurezza di Perskindol Cool con Sinfite nei bambini piccoli.

Quali effetti collaterali può avere Perskindol Cool con Sinfite?



L'uso di Perskindol Cool con Sinfito può provocare gli effetti collaterali seguenti:

occasionalmente leggero prurito cutaneo, arrossamento o sensazione di bruciore. Nella rara eventualità di reazioni di carattere eczematoso o nella rarissima eventualità di reazioni di ipersensibilità pronunciate o ustioni da freddo, si deve interrompere il trattamento ed eventualmente consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

L'alta concentrazione di tintura di sinfite (94,1%) può rendere il gel leggermente appiccicoso. Si consiglia quindi di lavarsi accuratamente le mani dopo aver massaggiato il prodotto sulla pelle.

Perskindol Cool con Sinfite non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Perskindol Cool con Sinfite?

Principi attivi

100 g di gel contengono 94,1 g di tintura di sinfite (*Symphyti radice recentis*), rapporto principio attivo/agente estrattivo 1:4, agente estrattivo etanolo 50% (p/p) (contiene 470,5 mg di etanolo/g di gel) e 2 g di levomentolo.

Sostanze ausiliarie

Copolimero metil-vinil etere/anidride maleica/1,9-decadiene, trometamolo, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

56015 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Perskindol Cool con Sinfite? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: Tubi da 50 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

