

▼ Questo medicamento è soggetto a monitoraggio addizionale. Ciò consente una rapida identificazione delle nuove conoscenze in materia di sicurezza. Può contribuire segnalando gli effetti collaterali. Per istruzioni sulle modalità di notifica degli effetti collaterali si veda al termine del capitolo «Quali effetti collaterali può avere Mounjaro?».

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

MOUNJARO® KwikPen

Eli Lilly (Suisse) SA

Che cos'è Mounjaro KwikPen e quando si usa?

Diabete mellito di tipo 2

Mounjaro KwikPen è un medicamento per iniezione e contiene il principio attivo tirzepatide ed è indicato per il trattamento del diabete mellito tipo 2 dell'adulto, degli adolescenti e dei bambini dall'età di 10 anni in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico.

Il diabete mellito tipo 2 è una patologia in cui il corpo non produce insulina a sufficienza e l'insulina prodotta non è così efficace come dovrebbe.

Quando ciò accade, lo zucchero nel sangue (glucosio nel sangue) aumenta. Un trattamento efficace del diabete con controllo efficace della glicemia protegge dalle conseguenze a lungo termine del diabete.

Inoltre, è importante seguire le indicazioni relative alla dieta e all'esercizio fisico fornite dal medico, dal farmacista o dall'operatore sanitario.

Regolazione cronica del peso corporeo

Mounjaro viene inoltre utilizzato, insieme alla dieta e all'esercizio fisico, per ottenere una riduzione del peso e favorire il controllo del peso in pazienti adulti con

- indice di massa corporea (IMC) pari o superiore a 30 kg/m² (obesità) o
- indice di massa corporea (IMC) di almeno 27 kg/m², ma inferiore a 30 kg/m² (sovrappeso) e patologie correlate al peso (come prediabete, diabete mellito di tipo 2, pressione alta, alterazione dei valori dei lipidi nel sangue, difficoltà di respirazione durante il sonno, detta anche apnea ostruttiva nel sonno, o malattie cardiovascolari).

L'IMC è una misura del suo peso in relazione alla sua statura.

Quando non si può usare Mounjaro KwikPen?

Mounjaro KwikPen non si può usare in presenza di allergie al principio attivo tirzepatide o a una delle sostanze ausiliarie di questo medicamento (vedere «Cosa contiene Mounjaro KwikPen?»).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Mounjaro KwikPen?

Si rivolga al medico, al farmacista o all'operatore sanitario prima di usare Mounjaro KwikPen se:

- soffre di gravi problemi di digestione o il cibo permane nello stomaco più a lungo del normale (compresa la cosiddetta grave gastroparesi);
- ha sofferto in passato di infiammazione del pancreas (pancreatite), che causa forti e costanti dolori addominali e dorsali. Sono stati osservati casi di pancreatite in pazienti che usano Mounjaro KwikPen. La pancreatite è una malattia grave potenzialmente letale. Interrompa l'uso di Mounjaro KwikPen e si rivolga al suo medico se avverte un forte e persistente dolore allo stomaco con o senza vomito, perchè potrebbe essere dovuto a pancreatite;



- soffre di disturbi agli occhi (retinopatia diabetica o edema maculare);
- fa uso di sulfoniluree o insulina per il trattamento del diabete, poiché in questo caso può presentarsi una diminuzione dello zucchero nel sangue (ipoglicemia). Per ridurre tale rischio, il medico può cambiare la dose di questi altri medicinali;
- soffre di una malattia della tiroide, inclusi noduli e ingrossamento della tiroide;
- soffre o ha sofferto di una malattia della cistifellea;
- ha pensieri suicidari, comportamenti suicidari o una storia di precedenti tentativi di suicidio;
- nota insolite variazioni dell'umore o del comportamento;
- nota un peggioramento di uno stato depressivo già in atto.

All'inizio del trattamento con Mounjaro KwikPen, in alcuni casi può presentarsi una perdita di liquidi/disidratazione, ad es. in caso di vomito, nausea e/o diarrea, che può causare disturbi della funzionalità renale. È importante evitare la disidratazione assumendo liquidi in abbondanza. Si rivolga al suo medico per qualsiasi domanda o problema.

Informi il suo medico se durante il trattamento sviluppa gravi sintomi gastrointestinali (ad es. nausea, vomito, diarrea). Nei casi gravi o persistenti, il medico deciderà se interrompere il trattamento.

Sono stati riferiti eventi correlati a uno svuotamento gastrico compromesso, compresa gastroparesi grave (paralisi dello stomaco).

Nei pazienti trattati con tirzepatide sono stati riferiti eventi correlati alla malnutrizione, compresi eventi gravi. I rischi associati alla malnutrizione includono fra l'altro carenze di vitamine e minerali, carenze di proteine e un basso peso corporeo. È opportuno considerare il ricorso a un supporto per un'alimentazione equilibrata. Nei casi gravi o persistenti, il medico deciderà se interrompere il trattamento.

Questo medicamento non deve essere somministrato a bambini al di sotto dell'età di 10 anni trattati per il diabete di tipo 2 né a bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni per la riduzione del peso, perché non è stato studiato in questi gruppi di età.

Se sa che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico in anestesia (sonno), informi il suo medico che sta usando Mounjaro KwikPen.

Se usa Mounjaro KwikPen in associazione con una sulfonilurea o insulina può presentarsi una diminuzione dello zucchero nel sangue (ipoglicemia), che può ridurre la sua capacità di concentrazione. Si astenga dalla guida o dall'uso di macchinari se nota sintomi di ipoglicemia. Si rivolga al suo medico per ulteriori informazioni.

Se ha problemi di vista, **non** utilizzi la penna senza l'aiuto di una persona istruita all'uso della penna Mounjaro KwikPen.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Questo medicamento contiene 5.4 mg di alcol benzilico per dose (0.6 ml). L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche. Chieda consiglio al medico o al farmacista se è in gravidanza o sta allattando, o se ha una patologia al fegato o ai reni, questo perché grandi quantità di alcol benzilico possono accumularsi nel corpo e causare effetti indesiderati (come l'acidosi metabolica).

Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Mounjaro KwikPen durante la gravidanza o l'allattamento?

Mounjaro KwikPen può essere utilizzato durante la gravidanza solo su esplicita prescrizione del medico.

Mounjaro KwikPen non deve essere utilizzato per la riduzione del peso durante la gravidanza.



Se può rimanere incinta, dovrebbe utilizzare una contraccezione efficace durante il trattamento con Mounjaro KwikPen.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza chieda consiglio al medico prima di usare questo medicinale.

Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale, se intende allattare o sta allattando. Il medico deciderà se può procedere con l'allattamento o se deve smettere di allattare.

Come usare Mounjaro KwikPen?

Usi questo medicamento sempre esattamente secondo le indicazioni del suo medico o farmacista. In caso di dubbio sull'utilizzo del presente medicamento, chieda al medico o al farmacista.

Adulti

La dose iniziale è di 2.5 mg una volta alla settimana per quattro settimane. Dopo quattro settimane il medico dovrebbe aumentare il dosaggio a 5 mg una volta alla settimana.

Se la sua glicemia non è abbastanza sotto controllo con questo dosaggio, il medico può aumentare ulteriormente la dose a 7.5 mg, 10 mg, 12.5 mg o 15 mg una volta alla settimana. In ogni caso, ogni dosaggio deve essere mantenuto per almeno 4 settimane prima che il medico prescriva quello superiore.

Bambini e adolescenti di età compresa dai 10 ai 18 anni trattati per il diabete di tipo 2

La dose iniziale è di 2,5 mg una volta alla settimana per quattro settimane. Dopo quattro settimane il medico aumenterà la dose a 5 mg una volta alla settimana.

Se la sua glicemia non è abbastanza sotto controllo con questo dosaggio, il medico può aumentare ulteriormente la dose, in incrementi di 2,5 mg, a 7,5 mg o 10 mg una volta alla settimana. In ogni caso, ogni dosaggio deve essere mantenuto per almeno 4 settimane prima che il medico prescriva quello superiore. La dose massima è di 10 mg una volta alla settimana.

Può utilizzare la penna in qualsiasi momento della giornata indipendentemente dai pasti. Se possibile, la usi sempre lo stesso giorno della settimana. Come promemoria può annotare il giorno della settimana in cui ha iniettato la prima dose sulla confezione della penna pre-riempita o su un calendario.

Mounjaro KwikPen va iniettato sotto la pelle (per via sottocutanea) del ventre (addome) o della parte superiore della coscia. Se lei ha meno di 18 anni, l'iniezione di Mounjaro può essere effettuata da un operatore sanitario oppure può effettuarla personalmente se il medico ritiene che sia opportuno. Se l'iniezione viene effettuata da un'altra persona, può avvenire anche nella parte superiore posteriore del braccio.

Può effettuare l'iniezione settimanale sempre nella stessa zona del corpo, prestando tuttavia attenzione a cambiare sito d'iniezione in questa zona. Se inietta anche insulina, scelga per questa iniezione un sito diverso.

Nel caso in cui il trattamento con Mounjaro KwikPen sia associato a sulfonilurea o insulina, è importante controllare lo zucchero nel sangue, come prescritto dal medico, dal farmacista o dall'operatore sanitario.

Legga attentamente le «Istruzioni per l'uso» della penna pre-riempita prima di usare Mounjaro KwikPen.

Se ha assunto una quantità di Mounjaro KwikPen maggiore del dovuto, si rivolga subito al suo medico. Una dose eccessiva del presente medicamento può causare un forte calo dei livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia), in conseguenza del quale può sentirsi male o indisposto.

Se ha dimenticato di iniettarsi una dose, e avrebbe dovuto usare Mounjaro KwikPen

- **4 giorni prima o meno**, deve iniettare la dose il prima possibile. La dose successiva deve essere somministrata il giorno regolarmente programmato.
- **più di 4 giorni prima**, la dose che ha dimenticato deve essere saltata e la dose successiva deve essere somministrata il giorno regolarmente programmato.

Non assuma una dose doppia per compensare la dimenticanza di un'iniezione.



Se necessario, può cambiare il giorno dell'iniezione settimanale di Mounjaro KwikPen, a condizione che ci siano almeno 3 giorni (72 ore) tra due iniezioni.

Non interrompa il trattamento con Mounjaro KwikPen, senza prima aver parlato con il medico. Se interrompe il trattamento con Mounjaro e soffre di diabete di tipo 2, lo zucchero nel sangue può aumentare.

L'utilizzo e la sicurezza di Mounjaro KwikPen non sono stati valutati finora nei bambini e gli adolescenti al di sotto di 18 anni. Mounjaro KwikPen non può essere utilizzato per questi pazienti.

Se ha altre domande riguardo l'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'operatore sanitario.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Mounjaro KwikPen?

Molto comune (riguarda più di 1 persona trattata su 10)

- Nausea
- Diarrea
- Dolori addominali
- Stipsi
- Vomito

Livelli bassi di zucchero nel sangue (ipoglicemia) sono molto comuni quando Mounjaro KwikPen viene usato insieme ad altri medicinali che abbassano il livello di zucchero nel sangue come sulfoniluree e/o insulina (con o senza metformina). Se soffre di diabete di tipo 2 e usa una sulfonilurea o metformina o inietta insulina, in associazione con il trattamento di Mounjaro KwikPen può essere necessaria una riduzione del dosaggio.

Fra i sintomi di ipoglicemia rientrano mal di testa, stordimento, astenia, vertigini, sensazione di fame, confusione, irritabilità, palpitazioni e sudorazione. Il suo medico le spiegherà come procedere in caso di ipoglicemia.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone trattate su 100)

- Livelli bassi di zucchero nel sangue (ipoglicemia) – sono comuni, quando Mounjaro KwikPen viene usato per trattare un diabete di tipo 2 insieme a una combinazione di metformina e un cosiddetto inibitore SGLT2
- Livelli bassi di zucchero nel sangue (ipoglicemia) sono comuni, quando Mounjaro viene usato per trattare un diabete di tipo 2 da solo con metformina
- Reazioni allergiche (ipersensibilità) (ad es. eruzione cutanea, prurito ed eczema)
- Vertigini
- Pressione bassa
- Minore sensazione di fame (diminuzione dell'appetito)
- Vomito
- Disturbi della digestione (dispepsia)
- Stipsi
- Meteorismo (flatulenza)
- Eruttazione (rutti)
- Gonfiore
- Bruciore di stomaco (noto anche come reflusso gastroesofageo GERD) – causato dall'acido gastrico che risale alla cavità orale attraverso l'esofago)



- Perdita di capelli
- Stanchezza
- Reazioni nel sito d'iniezione (ad es. eruzione cutanea o arrossamento)

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone trattate su 1000)

- Occasionalmente, può insorgere un ritardo nello svuotamento gastrico.
- Pancreas infiammato (pancreatite acuta). La pancreatite è una malattia grave potenzialmente letale. Informi il suo medico se ha già sofferto di pancreatite, calcoli biliari o alcolismo o se ha avuto valori molto elevati di lipidi nel sangue. Tutti questi fattori possono aumentare il rischio di sviluppare una pancreatite o di una sua recidiva. Chiami immediatamente il suo medico, con o senza vomito, perchè potrebbe essere dovuto a pancreatite.
- Livelli bassi di zucchero nel sangue (ipoglicemia) – hanno una frequenza non comune quando Mounjaro KwikPen viene usato per trattare un diabete di tipo 2 negli adulti in associazione con metformina.
- Disturbi del gusto.

Occasionalmente si sono osservate alterazioni del gusto (disgeusia) o un'alterazione della sensibilità cutanea (disestesia).

Dal lancio sul mercato, in alcuni pazienti sono stati osservati calcoli biliari e infiammazione della cistifellea.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone trattate su 10 000)

Gravi reazioni allergiche (reazioni anafilattiche e angioedema) sono state riportate raramente. Si rivolga immediatamente al medico, se osserva sintomi quali: eruzioni cutanee, prurito e gonfiore improvviso del collo, del viso, della bocca o della gola; orticaria e difficoltà respiratorie.

Frequenza non nota (non può essere stimata sulla base dei dati disponibili)

Occlusione intestinale. Una grave forma di stipsi con sintomi aggiuntivi come dolori addominali, flatulenza, vomito ecc.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Questo medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

Termine di consumo dopo l'apertura

Mounjaro KwikPen può essere conservato non refrigerato in totale fino a 30 giorni a una temperatura non superiore a 30°C. In seguito il KwikPen deve essere smaltito.

Istruzioni di conservazione

Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).

Non congelare. La penna NON DEVE ESSERE UTILIZZATA se è stata congelata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Questo medicinale non deve essere utilizzato se si nota che la penna è danneggiata, o la soluzione appare torbida o sono visibili particelle.



Non getti il medicinale nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare il medicamento che non utilizza più.

KwikPen è una penna pre-riempita multiuso. Ogni KwikPen contiene 4 dosi. Gli aghi non sono inclusi.

Cosa contiene Mounjaro KwikPen?

Principi attivi

Mounjaro 2.5 mg KwikPen: 1 ml di soluzione contiene 4.17 mg di tirzepatide. Ogni penna pre-riempita multiuso contiene 4 dosi, ognuna di 2.5 mg di tirzepatide per 0.6 ml di soluzione.

Mounjaro 5 mg KwikPen: 1 ml di soluzione contiene 8.33 mg di tirzepatide. Ogni penna pre-riempita multiuso contiene 4 dosi, ognuna di 5 mg di tirzepatide per 0.6 ml di soluzione.

Mounjaro 7.5 mg KwikPen: 1 ml di soluzione contiene 12.5 mg di tirzepatide. Ogni penna pre-riempita multiuso contiene 4 dosi, ognuna di 7.5 mg di tirzepatide per 0.6 ml di soluzione.

Mounjaro 10 mg KwikPen: 1 ml di soluzione contiene 16.67 mg di tirzepatide. Ogni penna pre-riempita multiuso contiene 4 dosi, ognuna di 10 mg di tirzepatide per 0.6 ml di soluzione.

Mounjaro 12.5 mg KwikPen: 1 ml di soluzione contiene 20.83 mg di tirzepatide. Ogni penna pre-riempita multiuso contiene 4 dosi, ognuna di 12.5 mg di tirzepatide per 0.6 ml di soluzione.

Mounjaro 15 mg KwikPen: 1 ml di soluzione contiene 25 mg di tirzepatide. Ogni penna pre-riempita multiuso contiene 4 dosi, ognuna di 15 mg di tirzepatide per 0.6 ml di soluzione.

Sostanze ausiliarie

Sodio fosfato bibasico eptaidrato, alcol benzilico, glicerolo, fenolo, cloruro di sodio, idrossido di sodio e acido cloridrico al 10% (per regolare il valore del pH) e acqua per soluzioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

69696 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Mounjaro KwikPen? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Mounjaro 2.5 mg KwikPen soluzione iniettabile in penna pre-riempita multiuso: 1 penna (B)

Mounjaro 5 mg KwikPen soluzione iniettabile in penna pre-riempita multiuso: 1 penna (B)

Mounjaro 7.5 mg KwikPen soluzione iniettabile in penna pre-riempita multiuso: 1 penna (B)

Mounjaro 10 mg KwikPen soluzione iniettabile in penna pre-riempita multiuso: 1 penna (B)

Mounjaro 12.5 mg KwikPen soluzione iniettabile in penna pre-riempita multiuso: 1 penna (B)

Mounjaro 15 mg KwikPen soluzione iniettabile in penna pre-riempita multiuso: 1 penna (B)

Titolare dell'omologazione

Eli Lilly (Suisse) S.A., Vernier/Genève

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Istruzioni per l'uso

Mounjaro KwikPen Soluzione iniettabile in penna pre-riempita

Tirzepatide

Utilizzo sottocutaneo

Penna pre-riempita multidose monopaziente

Ogni penna contiene 4 dosi fisse, una dose assunta settimanalmente.



Penna pre-riempita da 2.5 mg/0.6 ml

Penna pre-riempita da 5 mg/0.6 ml

Penna pre-riempita da 7.5 mg/0.6 ml

Penna pre-riempita da 10 mg/0.6 ml

Penna pre-riempita da 12.5 mg/0.6 ml

Penna pre-riempita da 15 mg/0.6 ml

Queste istruzioni per l'uso contengono informazioni per l'iniezione con Mounjaro KwikPen.



Informazioni importanti da conoscere prima di effettuare un'iniezione con Mounjaro KwikPen

Legga le istruzioni per l'uso prima di iniziare a usare Mounjaro KwikPen e ogni volta che riceve una nuova Mounjaro KwikPen. Potrebbero esserci nuove informazioni. Queste informazioni non sostituiscono il colloquio con il medico, il farmacista o l'operatore sanitario in merito alle sue condizioni di salute e al suo trattamento.

Si faccia mostrare dal medico, il farmacista o l'operatore sanitario come iniettare correttamente Mounjaro.

Mounjaro KwikPen è una penna pre-riempita usa e getta per uso ripetuto. **La penna contiene 4 dosi predefinite; viene utilizzata una dose ogni settimana.** Inietti una dose unica (0.6 ml) sotto la pelle (per via sottocutanea) ogni settimana.

Dopo 4 dosi getti la penna insieme al medicamento non utilizzato. Dopo l'iniezione delle 4 dosi settimanali, la penna non consente più di impostare un'ulteriore dose completa (0.6 ml). **Non** inietti il medicamento rimanente.


Non utilizzi la sua KwikPen per altre persone, neanche se l'ago è stato sostituito. Gli aghi non possono essere riutilizzati o utilizzati insieme ad altre persone. Si potrebbero infettare altre persone o essere infettati da queste.

Si sconsiglia l'uso della penna da parte di persone non vedenti o ipovedenti senza il supporto di una persona addestrata al suo utilizzo.

Descrizione delle parti



Parti di Mounjaro KwikPen



Accessori necessari per somministrare l'iniezione




- Mounjaro KwikPen
- Aghi per penna adatti per KwikPen (si consigliano gli aghi BD [Becton, Dickinson and Company])
- Batuffolo imbevuto d'alcol
- Garza o benda di garza
- Contenitore di sicurezza o contenitore per uso domestico

Preparazione dell'iniezione con Mounjaro KwikPen


Da eseguire prima di ogni iniezione.

	Fase 1: • Si lavi le mani con acqua e sapone.
	Fase 2: • Rimuova il cappuccio di protezione della penna tenendolo diritto. • Controlli la penna e l'etichetta. Non utilizzi la penna • se il nome del medicamento o l'intensità della dose non corrispondono alla prescrizione. •



	dopo la data di scadenza (EXP) o se la penna sembra danneggiata. • se il medicamento è stato congelato, contiene grumi, è torbido o scolorito. Mounjaro deve essere da incolore a leggermente giallo.
	Fase 3: • Pulisca il dischetto sigillante interno rosso con un batuffolo imbevuto d'alcol.
	Fase 4: • Prelevi un ago nuovo. Per ogni iniezione utilizzi un ago nuovo per prevenire infezioni e l'ostruzione dell'ago stesso. • Rimuova la carta di protezione del cappuccio esterno dell'ago.
	Fase 5: • Applichi l'ago provvisto di cappuccio di protezione perpendicolarmente sulla penna e lo ruoti fino all'innesto.
  a. Cappuccio di protezione esterno dell'ago b. Cappuccio di protezione interno dell'ago	Fase 6: • Rimuova il cappuccio di protezione esterno dell'ago. Non lo getti. Sarà nuovamente necessario in seguito. • Estragga il cappuccio di protezione interno dell'ago e lo getti. Non tocchi l'ago.





Fase 7:

- Ruoti lentamente il pulsante di dosaggio fino a udire **2 clic** e a vedere la linea allungata  nell'indicatore della dose. Questa è la posizione di sfiato. Può essere corretta nella rispettiva direzione ruotando il pulsante di dosaggio finché la posizione di sfiato è a livello con l'indicatore della dose.



Fase 8:

- Tenga la penna con l'ago rivolta verso l'alto.
- Picchietti leggermente il portacartuccia in modo che le bolle d'aria si accumulino in alto.




Fase 9:

- Spruzzi in aria un po' di medicamento **premendo** fino all'arresto il **pulsante di dosaggio**, poi **conti lentamente fino a 5 tenendolo premuto**. Nell'indicatore della dose deve apparire il simbolo . **Non** inietti nel corpo. Lo sfiato rimuove l'aria dalla cartuccia garantendo il corretto funzionamento della penna. La penna è sfiata quando una piccola quantità di medicamento fuoriesce dalla punta dell'ago.
- Se non vede il medicamento, ripeta le **fasi 7-9** non più di 2 volte.
- Se non vede ancora il medicamento, sostituisca l'ago della penna e ripeta le **fasi 7-9** non più di 1 volta.



- Se non vede ancora il medicamento, si rivolga al suo medico, all'operatore sanitario o al farmacista.


Somministrazione della dose con Mounjaro KwikPen



a. Lato anteriore b. Lato posteriore

Fase 10:


- Scegli il sito di iniezione. Il medico, il farmacista o l'operatore sanitario potrà aiutarla a scegliere il sito di iniezione più adatto.
 - a. Lei, o un'altra persona, può iniettare il medicamento nella coscia o nell'addome, mantenendo una distanza di almeno 5 cm dall'ombelico.
 - b. Un'altra persona può effettuare l'iniezione nel lato posteriore del braccio.
- **Alterni** i siti di iniezione ogni settimana. Può utilizzare la stessa regione corporea, assicurandosi però di scegliere un sito di iniezione diverso.



Ruotare

Fase 11:


- Ruoti il pulsante di dosaggio fino all'arresto e finché nella finestra della dose appare il simbolo **1**. Il simbolo **1** corrisponde a una dose completa (0.6 ml).



Fase 12:

- a. Inserisca l'ago nella pelle.
- b. Somministri il medicamento **premendo** fino all'arresto il **pulsante di dosaggio**, poi **contando lentamente fino a 5 tenendolo premuto**. Prima di estrarre l'ago, nella finestra della dose deve apparire il simbolo **0**.





Fase 13:


- Estragga l'ago dalla cute. Una goccia di medicamento sulla punta dell'ago è normale. Ciò non influirà sulla dose.
- Verifichi che nella finestra della dose appaia il simbolo **0**.

Se nella finestra è visibile il simbolo **0**, avrà ricevuto la dose completa.

Se nella finestra non è visibile il simbolo **0**, inserisca di nuovo l'ago nella cute e termini l'iniezione. **Non** imposti una nuova dose.


Se continua a pensare di non aver ricevuto la dose completa, **non** ricominci l'iniezione dall'inizio e **non** inietti ancora il medicamento. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Eliminazione di anomalie di funzionamento".

Dopo l'iniezione con Mounjaro KwikPen




Fase 14:

- Se il sito di iniezione sanguina dopo aver estratto l'ago dalla cute, prema leggermente sul sito con un batuffolo imbevuto d'alcol o un pezzo di garza. **Non** sfregi il sito.



Fase 15:

- Riapplichi con cautela il cappuccio di protezione esterno dell'ago.




Fase 16:

- Sviti l'ago con il cappuccio di protezione esterno avvitato e lo smaltisca in un contenitore chiudibile e a prova di perforazione (vedere Smaltimento di Mounjaro KwikPen e degli aghi).

Non conservi la penna con l'ago applicato per evitare perdite, ostruzioni dell'ago o accumuli d'aria nella penna.





Fase 17:

- Riapplichi il cappuccio di protezione della penna.

Non conservi la penna senza cappuccio di protezione applicato.

Conservazione di Mounjaro KwikPen

Prima del primo impiego:

- Conservi le **penne non utilizzate** in **frigorifero** a una temperatura da 2 °C a 8 °C.
- Se conservate in frigorifero, le penne non utilizzate possono essere utilizzate fino alla data di scadenza stampata sull'etichetta.
- **Non** congeli la penna. Getti la penna se è stata congelata.

Dopo il primo impiego:

- Dopo il primo utilizzo può conservare la **penna utilizzata** a **temperatura ambiente** fino a 30 °C.
 - La protegga dal calore.
 - Conservi la penna e gli aghi fuori dalla portata dei bambini.
- Getti la penna 30 giorni dopo il primo utilizzo, anche se contiene ancora un po' di medicamento.

Smaltimento di Mounjaro KwikPen e degli aghi

- Smaltisca gli aghi usati in un contenitore di sicurezza subito dopo l'uso.
- **Non** smaltisca gli aghi sfusi della penna direttamente nei rifiuti domestici.
- Per gettare la penna usata, rimuova l'ago e la smaltisca nei rifiuti domestici o nel contenitore di sicurezza.
- Se non dispone di un contenitore di sicurezza, getti gli aghi usati in un contenitore di plastica rigida con un coperchio sicuro. Si rivolga all'operatore sanitario per imparare la corretta modalità di smaltimento di aghi, penne e del contenitore di sicurezza.
- Non riutilizzi il contenitore di sicurezza pieno.

Eliminazione di anomalie di funzionamento

- Se non si riesce a rimuovere il cappuccio di protezione dalla penna, lo ruoti delicatamente avanti e indietro quindi lo estragga tenendolo diritto.
- Se il pulsante di dosaggio è difficile da premere:
 - Premendo più lentamente il pulsante di dosaggio, l'iniezione sarà più facile.
 - L'ago potrebbe essere intasato. Inserisca un ago nuovo e sfiati la penna.
 - Polvere, residui di cibo o liquidi possono essere entrati nella penna. Smaltisca la penna e ne utilizzi una nuova.
- Se la penna impedisce di girare il pulsante di dosaggio finché si veda **1** nella finestra della dose:
 - Smaltire la penna, compreso il medicamento non utilizzato. Potrebbe non esserci abbastanza medicamento nella penna per somministrare una dose completa. Non provare a iniettare il medicamento rimanente.

Ulteriori informazioni:



In caso di domande o problemi con Mounjaro KwikPen, si rivolga al suo medico, all'operatore sanitario o al farmacista.

Calendario di somministrazione del medicamento

Utilizzi Mounjaro KwikPen una volta alla settimana	Mi inietto la mia dose settimanale (0.6 ml) nei seguenti giorni:			
Annoti il giorno della settimana che ha scelto per l'iniezione. Ogni settimana, effettui l'iniezione in questo giorno (ad esempio: lunedì).	(giorno/mese)	(giorno/mese)	(giorno/mese)	(giorno/mese)

