

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Prostaplant®-F, Capsule molli

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Prostaplant-F e quando si usa?

Prostaplant-F è un medicamento fitoterapeutico a base di un estratto di frutti di sabale e di un estratto di radici di ortica.

Prostaplant-F viene utilizzato per alleviare i disturbi causati da ingrossamento benigno della prostata (iperplasia prostatica benigna), quali ritardato inizio della minzione, getto urinario debole o interrotto, gocciolamento post-minzionale, sensazione di incompleto svuotamento vescicale.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento migliora i disturbi causati dall'ingrossamento della prostata, ma non elimina l'ingrossamento stesso. Se i disturbi alla prostata perdurano o aumentano, è necessario consultare il medico. Soprattutto in caso di febbre, sangue nelle urine o ritenzione urinaria acuta, bisogna rivolgersi al medico.

Quando non si può assumere Prostaplant-F e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non assumere in caso di ipersensibilità nota a uno dei componenti (vedere «Cosa contiene Prostaplant-F?»).

Prostaplant-F contiene soia. Se è allergico alle arachidi o alla soia, non usi questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Come usare Prostaplant-F?

Se il medico non prescrive diversamente, gli uomini adulti assumono 1 capsula molle 2 volte al giorno, senza masticarla e con un bicchiere d'acqua (circa 200 ml).

L'uso di Prostaplant-F non è destinato ai bambini e agli adolescenti sotto i 18 anni.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Prostaplant-F?

In seguito all'assunzione di Prostaplant-F possono comparire i seguenti effetti collaterali:

Possono comparire lievi disturbi gastro-intestinali. La frequenza non è nota. In casi rari possono comparire reazioni di ipersensibilità (generalì o della pelle come per es. prurito, eruzione cutanea, orticaria).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.



Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Prostaplant-F?

1 capsula molle contiene:

Principi attivi

160 mg di estratto di frutti di sabale (*Serenoa repens* (W.Bartram) Small, fructus), rapporto droga/estratto 10–14,3:1, agente di estrazione etanolo 93 % (V/V).

120 mg di estratto secco di radici di ortica (*Urtica dioica* L. oder *Urtica urens* L., radix), rapporto droga/estratto 7,6–12,5:1, agente di estrazione etanolo 68 % (V/V).

Sostanze ausiliarie

Grasso solido, olio di soia idrogenato 63,7 mg, silice colloidale anidra, glicerolo 85 %, succinilgelatina, ossido di ferro giallo, ossido di ferro nero, blu patentato V 85 %

Numero dell'omologazione

66329 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Prostaplant-F? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 60 e 120 capsule molli.

Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG

Erlistrasse 2

6403 Küssnacht am Rigi

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

