

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

DROPA pastiglie bronchiali nuova formula, pastiglie gommose

Che cosa sono le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula e quando si usano?

Le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula contengono come sostanze attive, oltre a due oli essenziali e mentolo, anche estratti vegetali dall'azione espettorante, in particolare il succo di radice di liquirizia. In base all'esperienza, le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula vengono impiegate per alleviare i disturbi in caso di tosse da raffreddamento e faringite con raucedine e mal di gola, in particolare in presenza di ipersecrezione di catarro ostinato.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se la tosse persiste per più di 7 giorni, rivolgersi al medico, al farmacista o al droghiere.

Quando non si possono assumere le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula?

Non somministrare in caso di ipersensibilità individuale già accertata nei confronti di una o più delle sostanze contenute (vedi composizione).

Non somministrare ai bambini (al di sotto dei 12 anni d'età).

Non somministrare a chi soffre di gravi affezioni renali o epatiche.

Senza l'esplicita approvazione del medico, non usare il preparato per più di 4 settimane consecutive.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione delle DROPA pastiglie bronchiali nuova formula?

Il sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei o il bambino è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il suo medico prima che lei o il bambino prenda questo medicamento.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si possono assumere le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, al farmacista o al droghiere.



Come usare le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula?

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti:

Lasciar sciogliere lentamente in bocca 1 pastiglia ogni ora, fino a un massimo di 8 pastiglie al giorno.

Bambini dai 12 anni in poi:

2–4 pastiglie al giorno da lasciar sciogliere in bocca. Senza l'esplicita approvazione del medico, non assumere il preparato per più di 4 settimane consecutive.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula?

Con l'assunzione delle DROPA pastiglie bronchiali nuova formula possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1'000)

Irritazione o allergie della pelle, degli occhi, delle vie respiratorie e del tratto digestivo.

Flatulenza o lieve diarrea.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Nausea, vomito.

In particolare, dosi superiori a quelle consigliate e l'assunzione prolungata possono provocare effetti mineralcorticoidi (perdita di potassio, ritenzione di acqua) dovuti al contenuto di estratto di liquirizia.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contengono le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula?

1 pastiglia gommosa contiene:

Principi attivi

3,1 mg olio essenziale d'anice, 1,4 mg olio di eucalipto, 1,4 mg estratto secco di radici di senega (Polygala senega L., radix, rapporto droga/estratto 3-6:1, mezzo di estrazione etanolo 30 % m/m), 3,9 mg



levomentolo, 60 mg glicerina, 129,6 mg succo di liquirizia.

Sostanze ausiliarie

Sorbitolo (E 420) 716 mg, gomma arabica, acesulfame K (E 950), acqua depurata, maltodestrina.

Numero dell'omologazione

68956 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le DROPA pastiglie bronchiali nuova formula? Quali confezioni sono disponibili?

Questo è un medicamento in vendita libera.

Confezioni da 40 pastiglie gommose.

Titolare dell'omologazione

DR. BÄHLER DROPA AG, CH-8045 Zürich

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

