

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Visine® Classic Hydro

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH

Che cos'è Visine Classic Hydro e quando si usa?

Visine Classic Hydro provoca una costrizione dei sottili vasi sanguigni della congiuntiva dell'occhio, decongestionando così la mucosa irritata del sacco congiuntivale. L'effetto è immediato dopo l'instillazione nell'occhio e il comfort visivo migliora per 12 ore.

Visine Classic Hydro è indicato per il trattamento sintomatico temporaneo (<72 ore) delle irritazioni oculari lievi. Stati d'irritazione possono essere dovuti ad es. a fumo, polvere, acqua clorata delle piscine, luce, correnti d'aria, cosmetici o lenti a contatto. Su raccomandazione del medico, farmacista o droghiere, questo preparato può essere usato anche per alleviare l'eccessiva lacrimazione nelle reazioni allergiche.

Quando non si può assumere/usare Visine Classic Hydro?

Visine Classic Hydro non deve essere usato nei bambini al di sotto di due anni, in caso di ipersensibilità (allergia) nota a uno o più costituenti, nei soggetti affetti da glaucoma ad angolo chiuso e in caso di stati d'irritazione oculare causata da infezioni o corpi estranei.

Evitare l'uso prolungato e il sovradosaggio.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Visine Classic Hydro?

In linea generale, quando si usano colliri, si deve tenere conto di quanto segue: talvolta l'arrossamento o l'irritazione sono dovuti a gravi lesioni dell'occhio, come ad es. infezioni, corpi estranei o azione meccanica, termica o chimica sulla cornea, che richiedono il trattamento da parte del suo medico.

Visine Classic Hydro deve essere utilizzato solo in caso di irritazioni oculari lievi e senza complicazioni. Se entro 72 ore non si ottiene un miglioramento, se l'irritazione e/o l'arrossamento persistono o aumentano, se insorgono dolori agli occhi, disturbi visivi come ad es. modificazioni improvvise nella visione, comparsa di «mosche volanti» o visione doppia o altri sintomi, è necessario interrompere l'uso del prodotto e consultare immediatamente il suo medico.

L'uso continuo o eccessivo del prodotto può causare un aumento dell'arrossamento degli occhi.

L'uso del prodotto può causare una temporanea dilatazione della pupilla.

I pazienti affetti da diabete, ipertiroidismo, ipertensione, aneurismi o malattie cardiache e gli anziani dovrebbero consultare il medico, farmacista o droghiere prima di utilizzare Visine Classic Hydro.

Visine Classic Hydro può causare offuscamento della vista e aumento della sensibilità alla luce. La capacità di guidare e di utilizzare attrezzi o macchine può quindi risultare compromessa. Non si deve partecipare al traffico o utilizzare macchine fino a quando la compromissione non si sarà attenuata.

Nota per i pazienti portatori di lenti a contatto:

Le lenti a contatto devono essere rimosse prima di instillare Visine Classic Hydro e non devono essere reinserite prima di 15 minuti dall'instillazione. Se opportuno, è meglio indossare gli occhiali durante il trattamento con Visine Classic Hydro.

Questo medicamento contiene 7,5 µg di fosfati per goccia.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,



- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Visine Classic Hydro durante la gravidanza o l'allattamento?

Se lei è incinta, prevede una gravidanza o allatta, deve utilizzare Visine Classic Hydro solo dopo aver consultato il suo medico, farmacista o droghiere.

Come usare Visine Classic Hydro?

Visine Classic Hydro è per uso oftalmico.

1. Prima del primo utilizzo, rimuovere il sigillo in plastica sul collo del flacone, strappandolo lungo la linea perforata.
2. Rimuovere il tappo di sicurezza a prova di bambino premendolo e ruotandolo in senso antiorario.
3. Dopo aver aperto il tappo, ruotare il flacone con l'apertura rivolta verso il basso. Inclinare la testa leggermente all'indietro. Premere delicatamente il flacone e versare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale. Per evitare la contaminazione della soluzione contenuta nel flaconcino, l'estremità del contagocce non deve entrare in contatto con nulla che non sia la chiusura stessa. Non toccare mai l'occhio con la parte terminale del contagocce!
4. Dopo l'instillazione, chiudere e aprire delicatamente l'occhio per qualche secondo per distribuire le gocce in modo uniforme.
5. Chiudere il tappo ruotandolo in senso orario finché non si ferma. Non toccare mai l'estremità del contagocce. Richiudere bene il contagocce subito dopo l'uso.

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti

Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale fino a 2-3 volte al giorno.

L'uso e la sicurezza nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Se Visine Classic Hydro è stato inavvertitamente ingerito, consulti immediatamente un medico o contatti il Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica (Tox-Info Suisse).

Quali effetti collaterali può avere Visine Classic Hydro?

Con l'uso di Visine Classic Hydro possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Irritazione oculare (dolore, dolore pungente, bruciore) e deterioramento della visione.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Dilatazione della pupilla, che può portare a visione offuscata, aumento della lacrimazione, bruciore all'interno e attorno agli occhi, arrossamento, irritazione, gonfiore, dolore e prurito.

In caso di gravi danni alla cornea (strato trasparente nella parte anteriore dell'occhio), i fosfati possono causare, in casi molto rari, un intorbidimento (macchie opache) della cornea dovuto all'accumulo di calcio durante il trattamento.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità



Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura, il flacone non va utilizzato per più di 4 settimane.

Richiudere bene il flaconcino subito dopo l'uso!

La soluzione deve essere smaltita se il colore risulta alterato o se la soluzione si è intorbidita.

Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperature superiori a 30°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Visine Classic Hydro?

Collirio, soluzione

Soluzione trasparente, da incolore a giallo pallido

Principi attivi

1 ml di Visine Classic Hydro contiene 0,5 mg di tetrizolina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Glicerolo (E 422), ipromellosa, macrogol 400, acido borico, sodio fosfato dibasico, sodio citrato diidrato, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio(S)-lattato, glicina, acido ascorbico, glucosio monoidrato, poliquaterno 42, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

68293 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Visine Classic Hydro? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconcino contagocce da 15 ml

Titolare dell'omologazione

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH, Risch, Domicilio: Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

