

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

WALA Bitter Elixier, Sirup

Anthroposophisches Arzneimittel

Wann wird WALA Bitter Elixier angewendet?

Gemäss der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis kann WALA Bitter Elixier zur Anregung der Verdauungstätigkeit angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob WALA Bitter Elixier gleichzeitig eingenommen werden darf. Bitte nehmen Sie WALA Bitter Elixier erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Enthält 7.1 g Saccharose pro 15 ml bzw. 2.4 g Saccharose pro 5 ml. Dies ist bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Wann darf WALA Bitter Elixier nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen / angewendet werden?

WALA Bitter Elixier darf nicht angewendet werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, insbesondere gegen Ingwer und Pfeffer
- bei Magen- und Darmgeschwüren
- bei Lebererkrankungen
- bei Obstruktion oder Entzündung der Gallenwege
- in der Schwangerschaft und Stillzeit
- bei Allergie gegen Beifussgewächse oder andere Korbblütler (Asteraceae)
- bei Kindern unter 6 Jahren

Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Elixier in diesen Fällen ohne ärztliche Verschreibung nicht angewendet werden.

Bei Gallensteinleiden oder anderen Gallenstörungen nur nach Rücksprache mit dem Arzt bzw. der Ärztin anwenden.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt bzw. eine Ärztin aufgesucht werden.

Die Behandlung sollte nach 5 Tagen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieses Zeitraumes keine Besserung ein, sollte ein Arzt bzw. eine Ärztin konsultiert werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,



- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf WALA Bitter Elixier während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der Inhaltsstoffe des enthaltenen Wermuts (Thujon) und der Kalmuswurzel (Asaron), darf WALA Bitter Elixier während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Wie verwenden Sie WALA Bitter Elixier?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, WALA Bitter Elixier mit Hilfe beiliegendem Messbecher wie folgt einnehmen:

Kinder ab 6 Jahren: 1- bis 3-mal täglich 5 ml.

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 1- bis 3-mal täglich 15ml.

WALA Bitter Elixier vor den Mahlzeiten unverdünnt oder in etwas Wasser verdünnt einnehmen.

Nicht für Kinder unter 6 Jahren. Vor Gebrauch schütteln!

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten oder mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann WALA Bitter Elixier haben?

Für WALA Bitter Elixier sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Nach Anbruch 3 Wochen haltbar.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15 - 25°C) lagern und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank (2 - 8°C) lagern.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in WALA Bitter Elixier enthalten?

5 ml Sirup enthalten:

Wirkstoffe

3528 mg Wässriger Extrakt aus 127 mg Enzianwurzeln (*Gentiana lutea* L., radix), 78 mg Ingwerwurzelstock (*Zingiber officinale* Roscoe, rhizoma), 12 mg Kalmuswurzelstock (*Acorus calamus* L., rhizoma), 2 mg Schwarzen Pfefferfrüchten (*Piper nigrum* L., fructus), 98 mg Wermutkraut (*Artemisia absinthium* L., herba),



Drogen-Extrakt-Verhältnis 1:11, Auszugsmittel Wasser

Hilfsstoffe

2352 mg Zucker (Saccharose), Wasser

Zulassungsnummer

33422 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie WALA Bitter Elixier? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen à 180 ml (200 g)

Zulassungsinhaberin

WALA Schweiz AG, 3011 Bern

Diese Packungsbeilage wurde im April 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

