

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

WALA Elisir amaro, Sciroppo

Medicamento antroposofico

Quando si usa WALA Elisir amaro?

Secondo la concezione antroposofica dell'uomo e della natura, WALA Elisir amaro si può usare per stimolare l'attività digestiva.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi della concezione antroposofica dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere WALA Elisir amaro.

Prenda WALA Elisir amaro soltanto dopo aver consultato il suo medico, se sa di soffrire di un'intolleranza agli zuccheri.

Contiene 7.1 g di saccarosio per 15 ml o 2.4 g di saccarosio per 5 ml. Questo deve essere preso in considerazione nei pazienti con diabete mellito.

Quando non si può assumere/usare WALA Elisir amaro e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

WALA Elisir amaro non deve essere usato

- in caso di ipersensibilità nota ai principi attivi, in particolare a zenzero e pepe
- in caso di ulcere gastriche e intestinali
- in caso di malattie del fegato
- in caso di ostruzioni o infiammazione delle vie biliari
- in caso di gravidanza e durante l'allattamento
- in caso di allergia alle piante di artemisia o alle asteracee
- nei bambini di età inferiore ai 6 anni

I disturbi della digestione nei bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere esaminati da un medico. Per questo motivo, l'elisir in questi casi non deve essere usato senza prescrizione medica.

In caso di disturbi correlati alla litiasi biliare o ad altri disturbi biliari usare solo dopo aver consultato il medico.

Consultare un medico in caso di disturbi persistenti o di origine non chiara.

Il trattamento dovrebbe essere concluso entro 5 giorni. Se entro questo periodo non si verifica un miglioramento, consultare un medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o



- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può assumere WALA Elisir amaro durante la gravidanza o l'allattamento?

A causa dei componenti dell'assenzio (tuione) e della radice di calamo (asarone), contenuti nel WALA Elisir amaro, esso non deve essere assunto durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare WALA Elisir amaro?

Salvo diversa prescrizione del medico, assumere WALA Elisir amaro come segue, utilizzando il misurino incluso:

Bambini a partire dai 6 anni: 5 ml da 1 a 3 volte al giorno.

Adolescenti a partire dai 12 anni e gli adulti: 15 ml da 1 a 3 volte al giorno.

Assumere WALA Elisir amaro non diluito – o diluito con acqua – prima dei pasti.

Non adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni. Agitare prima dell'uso!

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere WALA Elisir amaro?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso coretto di WALA Elisir amaro. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo apertura consumare entro 3 settimane.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15 - 25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Dopo apertura, tenere in frigorifero (2 - 8°C).

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene WALA Elisir amaro?

5 ml di sciroppo contengono:

Principi attivi

3528 mg di estratto acquoso di 127 mg di radice di genziana (*Gentiana lutea* L., radix), 78 mg di rizoma di zenzero (*Zingiber officinale* Roscoe, rhizoma), 12 mg di rizoma di calamo (*Acorus calamus* L., rhizoma), 2 mg di frutti di pepe nero (*Piper nigrum* L., fructus), 98 mg di artemisia (*Artemisia absinthium* L., herba), rapporto droga-estratto 1:11, solvente di estrazione: acqua

Sostanze ausiliarie

2352 mg di zucchero (saccarosio), acqua



Numero dell'omologazione

33422 (Swissmedic)

Dove è ottenibile WALA Elisir amaro? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi da 180 ml (200 g)

Titolare dell'omologazione

WALA Schweiz AG, 3011 Berna

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

