

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Lamisil Pedisan Crème/Spray

Medius AG

Qu'est-ce que Lamisil Pedisan et quand doit-il être utilisé?

Lamisil Pedisan crème et spray sont des médicaments destinés au traitement des mycoses des pieds. Ils agissent en éliminant le champignon responsable de la maladie. Lamisil Pedisan supprime les symptômes tels que démangeaisons, desquamations et rougeurs. Suite à un traitement d'une semaine avec Lamisil Pedisan, aucune récurrence n'était survenue après 2 mois chez la plupart des patients.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Afin de prévenir les mycoses des pieds, observez les règles suivantes:

- Changer les chaussettes tous les jours.
- Eviter de porter des chaussures trop justes.
- Sécher soigneusement la peau après le lavage.
- Changer tous les jours les serviettes.
- Ne pas marcher pieds nus. De plus, saupoudrer ou vaporiser chaque jour l'intérieur de vos chaussettes et de vos chaussures avec une poudre ou un spray efficace contre les mycoses.
- Bien se laver les mains après utilisation et après contact avec les parties cutanées atteintes, afin de prévenir la propagation de l'infection fongique.

Quand Lamisil Pedisan ne doit-il pas être utilisé?

N'utilisez pas Lamisil Pedisan si vous êtes allergique au principe actif terbinafine ou à l'un des excipients contenus dans la crème ou le spray (voir «*Que contient Lamisil Pedisan?*»).

Lamisil Pedisan n'a pas été étudiée pour l'emploi chez les enfants de moins de 12 ans. En l'absence d'expérience clinique, l'utilisation de Lamisil Pedisan chez les enfants de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Lamisil Pedisan?

Lamisil Pedisan crème et spray sont réservés à l'usage externe. Evitez tout contact avec les yeux. Le contact accidentel avec les yeux peut provoquer une irritation des yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, il faut immédiatement rincer soigneusement les yeux à l'eau courante. Consultez votre médecin si les troubles ne disparaissent pas.

Les nourrissons et les petits enfants ne doivent pas être en contact avec les zones de peau traitées.

Ne pas inhaler Lamisil Pedisan spray.

Lamisil Pedisan spray doit être utilisé avec précaution sur une peau lésée car ce produit contient:

Alcool: peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

Propylèneglycol (E1520): peut causer une irritation cutanée.

Lamisil Pedisan crème contient:



Alcool cétylique et alcool stéarylique: qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Alcool benzylique (E1519): peut provoquer des réactions allergiques et une légère irritation locale.

Lors de mycoses importantes ou lorsque la mycose atteint aussi les ongles, consultez votre médecin.

N'appliquez aucun autre médicament sur les parties cutanées atteintes.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous utilisez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Lamisil Pedisan peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Grossesse

Pendant la grossesse, Lamisil Pedisan ne doit être utilisé que sur ordonnance médicale expresse.

Si vous planifiez une grossesse, consultez d'abord votre médecin avant d'utiliser Lamisil Pedisan.

Allaitement

Pendant l'allaitement, Lamisil Pedisan ne doit pas être utilisé. Les petits enfants et les nourrissons ne doivent pas être en contact avec les zones de peau traitées.

Comment utiliser Lamisil Pedisan?

Avant d'appliquer Lamisil Pedisan, lavez soigneusement les parties cutanées atteintes avec un tampon d'ouate et de l'eau chaude puis séchez soigneusement.

Adultes et adolescents dès 12 ans

Lamisil Pedisan crème

Appliquer Lamisil Pedisan crème 1 fois par jour (matin ou soir). Appliquer Lamisil Pedisan crème en couche mince sur et autour des parties cutanées atteintes, masser légèrement pour faire pénétrer. Après l'application se laver et se sécher soigneusement les mains.

Lamisil Pedisan spray

Appliquer Lamisil Pedisan spray 1 fois par jour (matin ou soir) en imprégnant suffisamment la peau autour et sur les parties cutanées atteintes.

Schémas de traitement habituels:

Crème: 1 fois par jour pendant 1 semaine.

Spray: 1 fois par jour pendant 1 semaine.

Pour éviter les rechutes, suivez le traitement comme il est décrit ci-dessus. Si après une semaine aucune amélioration n'apparaît ou que les symptômes s'aggravent, consultez votre médecin.

Enfants de moins de 12 ans

L'utilisation et la sécurité du Lamisil Pedisan chez les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été étudiées.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Lamisil Pedisan peut-il provoquer?

L'utilisation de Lamisil Pedisan peut provoquer les effets secondaires suivants:



Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

desquamation, prurit

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

lésions cutanées, croûte, colorations cutanées, rougeurs, sensation de brûlure sur la peau, douleurs ou irritations au niveau de la zone d'application.

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10 000)

sécheresse cutanée, dermatite de contact, eczéma.

Très rare (concerne moins d'une personnes sur 10 000)

éruptions cutanées, vésicules (papules).

Si Lamisil Pedisan entre accidentellement en contact avec les yeux, des irritations oculaires peuvent survenir (cf. «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Lamisil Pedisan?»).

Arrêtez le traitement par Lamisil Pedisan et informez immédiatement votre médecin si vous développez un ou plusieurs des symptômes suivants. Ils peuvent être le signe d'une réaction allergique:

- troubles respiratoires ou problèmes de déglutition;
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge;
- fortes démangeaisons cutanées avec éruptions rouges ou vésicules (également au-delà de la zone d'application).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Après la première ouverture, Lamisil Pedisan spray se conserve 3 mois.

Remarques concernant le stockage

Conserver à 15-30 °C dans l'emballage d'origine.

Tenir hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Lamisil Pedisan?

Principe actif

Crème: 1 g de crème contient 10 mg de chlorhydrate de terbinafine (correspondant à 8.8 mg de terbinafine).

Solution pour pulvérisation cutanée: 1 g de spray contient 10 mg de chlorhydrate de terbinafine (correspondant à 8.8 mg de terbinafine).

Excipients



Crème: alcool cétylique, palmitate de cétyle, myristate d'isopropyl, hydroxyde de sodium, polysorbate 60, alcool stéarylique, stéarate de sorbitan, alcool benzylique (E1519), eau purifiée.

Solution pour pulvérisation cutanée: éthanol, éther cétostéarylique de macrogol, propylèneglycol (E1520), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

55775, 55776 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Lamisil Pedisan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Crème: tube de 15 g.

Spray: flacon à 15 et 30 ml.

Titulaire de l'autorisation

Medius AG, 4132 MuttENZ

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

