

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Lamisil Pedisan Crema/Spray

Medius AG

Che cos'è Lamisil Pedisan e quando si usa?

Lamisil Pedisan crema e spray sono medicinali per il trattamento delle micosi ai piedi. Funzionano uccidendo il fungo che causa la malattia. Il Lamisil Pedisan calma i sintomi quali prurito, desquamazione e arrossamento. Presso la maggioranza dei pazienti con le micosi ai piedi nessuna recidiva si è presentata 2 mesi dopo un trattamento di una settimana con Lamisil Pedisan.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Per prevenire in modo efficace le micosi ai piedi occorre rispettare alcune regole:

- Cambiare ogni giorno le calze.
- Evitare di portare delle scarpe troppo aderenti.
- Una volta lavata, asciugare accuratamente la pelle.
- Cambiare ogni giorno gli asciugamani.
- Non camminare a piedi nudi; cospargere ogni giorno le calze e l'interno delle scarpe con un talco o uno spray antimicotico.
- Lavarsi bene le mani dopo l'applicazione e dopo il contatto con la pelle infetta. In questo modo è possibile evitare la diffusione dell'infezione fungina.

Quando non si può usare Lamisil Pedisan?

Lamisil Pedisan non può essere usato in caso di ipersensibilità nota al principio attivo terbinafina o ad una delle sostanze ausiliarie contenute nella crema o nello spray (vedi «Cosa contiene Lamisil Pedisan?»).

L'uso di *Lamisil Pedisan* nei bambini sotto i 12 anni finora non è stato esaminato. A causa della mancanza di esperienza clinica, l'uso di Lamisil Pedisan nei bambini al di sotto dei 12 anni non è raccomandato.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lamisil Pedisan?

Lamisil Pedisan crema e spray sono indicati solo per uso esterno; non devono entrare a contatto con gli occhi. Contatto accidentale con gli occhi può causare irritazione agli occhi. Se entrati a contatto con gli occhi, bisogna lavarli immediatamente e accuratamente con acqua corrente. Consulti il suo medico se i disturbi non svaniscono.

Neonati e bambini non devono venire a contatto con le aree cutanee trattate.

Non inalare Lamisil Pedisan Spray.

Lamisil Pedisan spray deve essere usato con precauzione in caso di pelle danneggiata, perché contiene:

Alcool: può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Glicole propilenico (E1520): può causare irritazioni della pelle.

Lamisil Pedisan crema contiene:

Alcool stearilico e alcool cetilico: può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Alcool benzilico (E1519): può causare reazioni allergiche e lieve irritazione locale.



Se le micosi sono estese o se anche le unghie sono infette, bisogna consultare il medico.

Non applicare altri medicinali sulle aree cutanee trattate.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Lamisil Pedisan durante la gravidanza o l'allattamento?

Gravidanza

Durante la gravidanza Lamisil Pedisan non deve essere usato, salvo espressa prescrizione del medico.

Se sta pianificando una gravidanza, applicare Lamisil Pedisan solo dopo aver consultato un medico.

Allattamento

Durante l'allattamento non usare Lamisil Pedisan. Bambini e neonati non devono venire a contatto con le aree cutanee trattate.

Come usare Lamisil Pedisan?

Prima dell'applicazione di Lamisil Pedisan, le aree cutanee malate devono essere pulite a fondo con un batuffolo di ovatta imbevuto di acqua calda, quindi asciugate.

Adulti e adolescenti dai 12 anni

Lamisil Pedisan crema

Applicare Lamisil Pedisan crema in un strato fino una volta al giorno – mattina o sera – sulle aree cutanee malate e sulle parti che circondano la zona lesa, massaggiando leggermente per farla penetrare. Lavare e asciugare accuratamente le mani dopo l'applicazione.

Lamisil Pedisan spray

Usare Lamisil Pedisan spray una volta al giorno – mattina o sera – sulle aree cutanee malate e sulle parti che circondano la zona lesa, abbastanza umettare.

Schemi usuali di trattamento:

Crema: 1 volta al giorno per 1 settimana.

Spray: 1 volta al giorno per 1 settimana.

Per evitare una ricaduta, si attenga alla durata di trattamento indicata. Se i disturbi si aggravano o se dopo una settimana non si vede nessun miglioramento, bisogna consultare un medico.

Bambini sotto i 12 anni

L'uso e la sicurezza di Lamisil Pedisan non sono stati esaminati nei bambini sotto i 12 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Lamisil Pedisan?

Con l'applicazione di Lamisil Pedisan possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Desquamazione cutanea, prurito.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)



Lesioni cutanee, croste, scolorimento della pelle, arrossamenti, sensazione di bruciore sulla pelle, dolore o irritazione in corrispondenza della zona di applicazione.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Secchezza cutanea, dermatite da contatto o eczema.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Eruzioni cutanee o vesciche (papule).

Se Lamisil viene accidentalmente a contatto con gli occhi, può verificarsi irritazione all'occhio (vedere «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lamisil Pedisan?»).

Interrompere il trattamento con Lamisil Pedisan e informare subito il suo medico se si verificano uno o più dei seguenti sintomi che possono essere segni di una reazione allergica:

- difficoltà di respirazione o deglutizione,
- gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola,
- grave prurito della pelle con eruzione cutanea rossa o vesciche (anche oltre la zona di applicazione).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo il primo uso, Lamisil Pedisan spray si conserva 3 mesi.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a 15-30 °C nella confezione originale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Lamisil Pedisan?

Principio attivo

Crema: 1 g di crema contiene 10 mg di idrocloruro di terbinafina (corrispondenti a 8.8 mg di terbinafina).

Spray cutaneo, soluzione: 1 g di spray contiene 10 mg di idrocloruro di terbinafina (corrispondenti a 8.8 mg di terbinafina).

Sostanze ausiliarie

Crema: alcool cetilico, cetile palmitato, isopropile miristato, sodio idrossido, polysorbato 60, alcool stearilico, sorbitano stearato, alcool benzilico(E1519), acqua depurata.

Spray cutaneo, soluzione: etanolo, macrogol cetostearile etere, glicole propilenico (E1520), acqua depurata.

Numero dell'omologazione

55775, 55776 (Swissmedic).



Dove è ottenibile Lamisil Pedisan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Crema: tubetto da 15 g.

Spray: bottiglia da 15 e 30 ml.

Titolare dell'omologazione

Medius AG, 4132 MuttENZ

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

