

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Glaupax®

OmniVision AG

Qu'est-ce que Glaupax et quand doit-il être utilisé?

Glaupax est utilisé pour traiter l'élévation de la pression intraoculaire. Glaupax agit sur le métabolisme des tissus sécréteurs de liquide. Il entraîne non seulement une augmentation de l'élimination d'eau (diurèse), mais également une diminution de la production d'humeur aqueuse, ce qui a pour effet d'abaisser la pression intraoculaire des patients souffrant de glaucome.

Selon prescription du médecin.

Quand Glaupax ne doit-il pas être utilisé?

- En cas d'hypersensibilité (allergie) connue ou suspectée à l'un des constituants de Glaupax, ainsi qu'aux sulfamides.
- En cas de maladies graves du foie, y compris les cirrhoses.
- En cas d'insuffisance corticosurrénale ou d'insuffisance rénale.
- En cas de troubles hématologiques.
- En cas de troubles de l'équilibre des sels (minéraux) de l'organisme.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Glaupax?

Si vous utilisez Glaupax, votre médecin doit régulièrement faire analyser votre sang.

Si des maux de gorge persistants, une fièvre, une fatigue, des bleus fréquents et légers, des saignements de nez ou une grande pâleur ou une coloration jaune de la peau apparaissent pendant le traitement par Glaupax, consultez immédiatement votre médecin.

Une prudence particulière est de mise lors de la prise de ce médicament dans les cas suivants:

- vous présentez actuellement ou avez présenté dans le passé des troubles rénaux, par ex. calculs rénaux;
- vous avez des troubles pulmonaires, par ex. bronchite chronique ou emphysème, qui provoquent des difficultés respiratoires;
- vous avez développé des troubles pulmonaires ou respiratoires (présence de liquide dans les poumons) dans le passé après avoir pris de l'acétazolamide. Si vous ressentez un essoufflement ou des difficultés à respirer après avoir pris Glaupax, consultez immédiatement un médecin (voir « Quels effets secondaires Glaupax peut-il provoquer ? »);
- vous avez un diabète ou des problèmes de régulation de la glycémie;
- vous avez plus de 65 ans;
- vous souffrez de goutte;
- vous remarquez une éruption cutanée ou tout autre symptôme allergique sur votre corps;
- vous constatez une baisse de votre acuité visuelle et/ou vous avez des douleurs oculaires, car celles-ci peuvent être dues à une augmentation de la pression intraoculaire après la prise d'acétazolamide. Dans ces cas, Glaupax doit être arrêté le plus rapidement possible et la pression



intraoculaire doit être réduite.

Une diminution de la vision ou des douleurs oculaires peuvent être les symptômes d'une accumulation de liquide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroïdien ou décollement choroïdien).

Cela peut se produire dans les heures qui suivent la prise de Glaupax. Consultez immédiatement votre médecin si vous développez ces symptômes.

Un nombre réduit de patients traités par des antiépileptiques tels que l'acétazolamide ont eu des pensées d'automutilation ou de suicide. Veuillez contacter immédiatement votre médecin si vous avez ce type de pensées à un moment quelconque.

En cas de traitement de longue durée par acétazolamide, le taux de potassium doit être contrôlé.

L'utilisation de Glaupax peut entraîner des résultats positifs lors de contrôles antidopage.

L'utilisation de l'acétazolamide chez les enfants peut provoquer des retards de croissance.

Aptitude à la conduite et l'utilisation de machines

Glaupax peut provoquer une fatigue, une confusion ou des troubles de la vision et affecter par conséquent les réactions, l'aptitude à la conduite et la capacité à utiliser des outils ou des machines ! Si vous ressentez de tels effets secondaires après avoir pris Glaupax, vous ne devez pas conduire ni utiliser de machines.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, en particulier ceux énumérés ci-dessous, car ils peuvent influencer l'effet de Glaupax:

- médicaments contre la goutte (probénécide et sulfinpyrazone);
- stéroïdes tels que la prednisolone pour le traitement de l'asthme ou de l'arthrite;
- médicaments contre l'épilepsie ou les convulsions (notamment phénytoïne, phénobarbital, carbamazépine, primidone ou acide valproïque);
- antidiabétiques destinés à réduire la glycémie (par ex. sulfonilurées);
- diurétiques comme le furosémide ou les thiazides;
- amphotéricine B pour le traitement des infections fongiques;
- antidépresseurs tricycliques pour le traitement de la dépression;
- aspirine et médicaments apparentés, par ex. acide salicylique;
- médicaments pour le cœur, comme les glycosides cardiaques;
- médicaments contre les infections des voies urinaires (méthénamine);
- médicaments contenant de l'amphétamine (un stimulant) ou du lithium (pour le traitement de troubles psychiques sévères);
- éphédrine comme décongestionnant;
- quinidine, mexilétine ou procainamide (pour le traitement des troubles du rythme cardiaque);
- bicarbonate de sodium (pour le traitement de maladies caractérisées par un excès d'acide dans l'organisme);
- médicaments antinéoplasiques (pour le traitement du cancer, par ex. méthotrexate);
- autres médicaments de la classe des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (pour le traitement de l'élévation de la pression intraoculaire);
- médicaments qui interfèrent avec l'acide folique (par ex. pyriméthamine ou triméthoprime);
- médicaments destinés à fluidifier le sang (par ex. warfarine);
- médicaments destinés à faire baisser la tension artérielle (par ex. propranolol)
- substances qui provoquent une hypertension;
- bêta-bloquants ou pilocarpine;



- ciclosporine (utilisée comme immunosuppresseur après une transplantation);
- neuroleptiques, comme le dropéridol.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez ou utilisez d'autres médicaments à usage ophtalmique (même en automédication !).

Glaupax peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Il n'existe pas d'études contrôlées sur Glaupax pendant la grossesse ou l'allaitement. Glaupax ne doit donc pas être pris pendant la grossesse (surtout pendant les trois premiers mois) si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, à moins que le médecin ne le prescrive expressément.

L'acétazolamide, principe actif de Glaupax, passe dans le lait maternel. Pendant l'allaitement, vous devez demander conseil à votre médecin pour savoir si vous pouvez prendre Glaupax.

Comment utiliser Glaupax?

Adultes

La dose journalière est habituellement de ½ à 1 comprimé (125 à 250 mg) à prendre 1 à 2 fois par jour.

Les comprimés ont un sillon de sécabilité en croix sur une face. Le comprimé peut être fractionné en deux parties égales.

En cas de glaucome aigu, votre médecin peut vous prescrire pour une courte durée des doses plus élevées.

Enfants et adolescents

L'utilisation et la sécurité des comprimés Glaupax n'ont pas été étudiées à ce jour chez les enfants et les adolescents.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Glaupax peut-il provoquer?

Tous les médicaments peuvent provoquer des réactions allergiques, mais les réactions allergiques graves sont très rares. Contactez immédiatement un médecin en cas d'apparition soudaine d'une respiration sifflante, de difficultés respiratoires, d'un gonflement des paupières, du visage ou des lèvres, d'une éruption cutanée ou de démangeaisons (en particulier sur tout le corps).

Informez immédiatement votre médecin si vous avez des maux de gorge persistants, une fièvre, une fatigue, des saignements de nez, des bleus fréquents et légers, une grande pâleur ou une coloration jaune de la peau.

Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants: essoufflement ou difficultés respiratoires. Il peut s'agir de symptômes d'une accumulation de liquide dans les poumons (œdème pulmonaire). La fréquence de cet effet indésirable ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles (inconnue).

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de l'utilisation de Glaupax:

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100):

Picotements et engourdissement de la peau (paresthésies), perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, troubles du goût, hyperacidité (acidose métabolique), troubles de la coordination motrice (ataxie), maux de tête, vertiges, hypotension, sécheresse buccale, tensions musculaires, crampes au mollet, besoin d'uriner accru, fatigue.

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1'000):



Myopie transitoire, troubles de l'équilibre électrolytique (potassium, calcium, sodium, magnésium, chlorure), hypercalciurie, confusion et dépression secondaires à un traitement prolongé, excitation, paralysie flasque et convulsions, bourdonnements d'oreille et troubles de l'audition, augmentation des difficultés respiratoires chez les patients souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, selles goudronneuses, valeurs anormales de la fonction hépatique, urticaire, présence de sang ou de sucre dans les urines, soif.

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10'000):

Atteinte rénale, cristallurie (sels dissous dans l'urine), formation de calculs de phosphate de calcium dans les reins, dégradation du tissu hépatique, augmentation de la taille du foie (hépatite), coloration jaune de la peau et des yeux, urine foncée et selles claires (jaunisse).

Très rare (concerne moins d'une personnes sur 10'000):

Valeurs anormales de la fonction hépatique, modifications de la formule sanguine, troubles du flux sanguin dans les plus petits vaisseaux (purpura thrombocytopénique), effets secondaires des sulfamides tels qu'une éruption cutanée (exanthème), des signes caractéristiques ou des lésions surélevées de la peau (érythème polymorphe), cloques sur la peau autour des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des organes génitaux, symptômes pseudo-grippaux et fièvre. Il pourrait s'agir du syndrome de Stevens-Johnson. Dans les formes sévères de nécrolyse épidermique toxique, des couches de peau peuvent se détacher et laisser apparaître de grandes zones de peau à vif et non protégée sur tout le corps. Sensibilité accrue à la lumière (photosensibilisation), réaction allergique (anaphylactique) immédiate pouvant aller jusqu'au choc.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles):

Diminution du nombre de cellules sanguines (pancytopénie), diminution de la production de cellules sanguines dans la moelle osseuse, augmentation ou diminution de la glycémie (peuvent survenir lors d'un traitement de longue durée). Ramollissement des os (ostéomalacie, peut survenir lors d'un traitement de longue durée par phénytoïne), irritabilité, faiblesse, engourdissement, baisse des performances, épanchement choroïdien, décollement choroïdien, glaucome à angle fermé, douleurs spasmodiques, réaction cutanée allergique grave due au médicament (pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)), coliques néphrétiques et urétérales, atteinte et défaillance rénale, troubles de l'équilibre électrolytique (potassium, calcium, sodium, magnésium, chlorure) avec crampes musculaires ou crampes au mollet, surtout en cas de traitement de longue durée, augmentation du taux d'acide urique dans le sang et crises de goutte, bouffées de chaleur, baisse de la libido, fièvre.

La plupart des effets secondaires disparaissent au bout de quelques jours sans qu'il soit nécessaire d'interrompre le traitement.

Glaupax peut provoquer des effets secondaires que vous ne remarquerez pas normalement, comme des changements dans les électrolytes (sels). Votre taux de glycémie peut être modifié. Parlez-en à votre médecin. En cas de traitement de longue durée par ce médicament, vous devez faire des analyses de sang régulières.

L'utilisation de l'acétazolamide chez les enfants peut provoquer des retards de croissance.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Conserver dans l'emballage d'origine.

Conserver hors de portée des enfants.



Remarques complémentaires

Une fois le traitement terminé, ramenez les comprimés restants non utilisés au point de vente (médecin ou pharmacien) pour une élimination en bonne et due forme.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Glaupax?

Principe actif

1 comprimé contient 250 mg d'acétazolamide.

Excipients

Amidon de maïs, hydrogénophosphate de calcium dihydraté, cellulose microcristalline, talc, povidone K 30, glycérol 85%, gélatine, stéarate de magnésium, acide alginique.

Numéro d'autorisation

38412 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Glaupax? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 40 et 100 comprimés (sécables).

Titulaire de l'autorisation

OmniVision AG, 8212 Neuhausen.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

