

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

PROALLER, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa PROALLER?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, PROALLER può essere usato in caso di allergie.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere PROALLER.

Quando non si può assumere PROALLER e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Questo medicamento contiene 169 mg di alcol (etanolo) per dose (20 gocce), equivalenti a 256 mg/ml (25,6 % p/V). La quantità contenuta in 20 gocce di questo medicamento equivale a meno di 5 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicamento non ha effetti evidenti.

Per i bambini di età inferiore a 2 anni, si raccomanda l'uso di PROALLER in globuli.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere PROALLER durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare PROALLER?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere il prodotto 3-4 volte al giorno, diluito in un liquido, prima dei pasti. Gli adulti e gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni assumono 20 gocce, i bambini di età inferiore ai 12 anni assumono invece 10-15 gocce.

Per i bambini di età inferiore a 2 anni, si raccomanda l'uso di PROALLER in globuli. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo



droghiere.

Quali effetti collaterali può avere PROALLER?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con PROALLER e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di PROALLER.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

PROALLER è disponibile anche in versione senza alcol, sotto forma di globuli.

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene PROALLER?

1 g di liquido (= 1,03 ml / 31 gocce) contiene:

Principi attivi

Acidum formicicum (HAB) D3 100 mg

Calcium fluoratum (HAB) D8 160 mg

Euphrasia stricta et/aut Euphrasia officinalis ex planta tota cum floribus spag. Peka D4 (HAB 47a) 120 mg

Nerium oleander (HAB) D4 160 mg

Pulsatilla pratensis ex planta tota cum floribus spag. Peka D4 (HAB 47a) 120 mg

Schoenocaulon officinale (HAB) D12 180 mg

Scrophularia nodosa (HAB) TM 160 mg

Sostanze ausiliarie

etanolo, acqua purificata.

Contiene 32 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

51253 (Swissmedic)

Dove è ottenibile PROALLER? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml.



Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

