

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare il medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo consultare in futuro.

Alpicort®-F

Alcina AG

Che cos'è Alpicort F e quando si usa?

Alpicort F è un preparato per il trattamento di fenomeni infiammatori del cuoio capelluto e dei capelli della donna.

Tali fenomeni infiammatori sono ritenuti essere la causa di molti tipi di caduta dei capelli.

Grazie ad Alpicort F vengono eliminati i fenomeni infiammatori e normalizzata la secrezione sebacea.

In virtù dei suoi principi attivi, Alpicort F blocca la secrezione sebacea, stimola la circolazione sanguigna, allevia il prurito e ha un'azione antinfiammatoria.

Inoltre l'acido salicilico riduce la formazione eccessiva di forfora – in particolare anche in caso di dermatosi squamosa della testa e di psoriasi – e la previene.

Alpicort F viene utilizzato dietro prescrizione medica in diversi tipi di alopecia, nell'eccessiva produzione di sebo (capelli grassi), nell'eczema di natura oleosa e nella psoriasi della zona capillare.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Alpicort F non deve entrare in contatto con gli occhi o le mucose. Se ciò accadesse, sciacquare subito e accuratamente con acqua pura.

Quando non si può usare Alpicort F?

Alpicort F non deve essere usato in caso di ipersensibilità nei confronti di un componente del preparato.

Alpicort F non deve essere usato in caso di varicella (vescicole a punta), alcune malattie della pelle (sifilide, tubercolosi, rosacea), piaghe aperte e infiammazioni purulente, tumori ormono-dipendenti (estrogeno-dipendenti), sanguinamenti inspiegabili dagli organi genitali, malattie acute ed essudative del cuoio capelluto e danni renali.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Alpicort F?

Alpicort F può essere usato solo per via esterna.

Alpicort F non deve entrare in contatto con gli occhi o le mucose.

Se una malattia della pelle non si risolve entro alcuni giorni di trattamento, o al contrario peggiora, consulti il suo medico di fiducia.

Informi il suo medico anche se si manifestano prurito o arrossamento cutaneo, vescicole, un marcato assottigliamento della pelle e piaghe.

Usi Alpicort F solo per i problemi cutanei in atto per i quali il medico le ha prescritto il prodotto e non per altri successivi disturbi.

Non dia Alpicort F ad altre persone.

Informi il suo medico o farmacista se

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica per uso esterno altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!



Informi il suo medico nel caso in cui si verificano visione offuscata o disturbi oculari. Il suo medico deciderà se consultare un oculista per determinare quali sono le possibili cause (inclusa la cataratta, il glaucoma o altre malattie rare) dei suoi disturbi oculari.

Si può usare Alpicort F durante la gravidanza o l'allattamento?

Alpicort F può causare danni al feto. In caso di gravidanza in atto o pianificata non utilizzare in nessun caso Alpicort F. Prima di intraprendere una tale terapia nelle donne in età riproduttiva, occorre escludere con certezza un'eventuale gravidanza e impiegare durante la terapia un metodo anticoncezionale sicuro.

Come usare Alpicort F?

Salvo diversa prescrizione medica, si raccomanda la seguente applicazione:

1. Pulizia di pre-trattamento: lavare la testa con uno shampoo delicato una o due volte la settimana. Già durante il procedimento di pulizia massaggiare il cuoio capelluto esercitando una pressione con le dita per rimuovere il sebo dai follicoli capillari e dalle ghiandole sebacee. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente con acqua pulita.
2. Trattamento con Alpicort F: fino all'arresto della caduta dei capelli applicare Alpicort F sul cuoio capelluto, preferibilmente la sera. Dopodiché è sufficiente applicare Alpicort F 2 o 3 volte la settimana.

Per migliorare l'efficacia del trattamento e per stimolare la circolazione sanguigna, dopo l'applicazione di Alpicort F si raccomanda di massaggiare nuovamente il cuoio capelluto facendo pressione con le dita per circa 3 minuti.

Dato il contenuto di corticosteroidi, la durata del trattamento di piccole aree non dovrebbe essere superiore a 2 - 3 settimane. L'esperienza clinica è disponibile per periodi di trattamento fino a 6 mesi. Non è stata studiata la durata dell'effetto dopo la sospensione del preparato.

Alpicort F non è indicato per bambini e ragazzi.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia o la durata del trattamento prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Alpicort F?

Nelle indicazioni di frequenza degli effetti collaterali vengono adottate le seguenti categorie:

Molto frequenti: più di 1 utilizzatore su 10

Frequenti: da 1 a 10 utilizzatori su 100

Occasionali: da 1 a 10 utilizzatori su 1000

Rari: da 1 a 10 utilizzatori su 10000

Molto rari: meno di 1 utilizzatore su 10000

Frequenti: irritazioni cutanee temporanee (ad. es. bruciore, arrossamento, prurito, secchezza della cute).

Rari: reazioni cutanee allergiche.

Molto rari: come per tutti i preparati a contenuto di corticoidi si possono verificare alterazioni cutanee (diminuzione dello spessore cutaneo, allargamento di piccoli vasi cutanei, formazione di smagliature, acne medicamentosa, dermatite periorale, aumento dei peli corporei).

Singoli casi: visione offuscata e altri disturbi visivi (vedere anche «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Alpicort F?»).

A causa della ridotta difesa immunologica locale esiste un elevato rischio che possano insorgere infezioni secondarie

In caso di un trattamento prolungato e a dosaggio elevato o su superfici ampie i principi attivi possono essere assimilati nel sangue. Ciò può provocare altri effetti collaterali, tra cui: ritenzione idrica (edemi), alterazioni della cute sotto forma di strisce (striae distensae), sviluppo del diabete (diabetes mellitus), perdita di tessuto osseo (osteoporosi) e/o tensione mammaria (mastodinia), disturbi digestivi,



sanguinamenti uterini.

Se nota la comparsa di altri effetti indesiderati non menzionati in questo foglietto illustrativo, informi il suo medico o farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

I medicinali devono essere conservati con cura e nella loro confezione originale, fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Non refrigerare o congelare.

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Dopo l'apertura della confezione la soluzione si mantiene inalterata per 24 mesi.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contiene Alpicort F?

Principi attivi: 1 ml contiene 2 mg di prednisolone, 4 mg di acido salicilico, 0,05 mg di benzoato di estradiolo.

Eccipienti: glicole propilenico, altri eccipienti.

Numero dell'omologazione

42'684 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Alpicort F? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione (bottiglia) da 100 ml.

Titolare dell'omologazione

Alcina AG, 4132 Muttensz (Svizzera)

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

